

Machado (J.A)

monographia xx

(wp. 16)



16

MONOGRAPHIA

DAS

PRINCIPAES AFFECÇÕES PANTANOSAS,

Precedida das descripções dos climas em geral,


E EM

PARTICULAR DOS CLIMAS QUENTES

POR

Tolentino Augusto Machado,

Doutor em Medicina, Cirurgião pela novissima Escola Medica-Cirurgica de Lisboa, Socio correspondente da Sociedade de Sciencias Medicas da mesma Cidade, Membro do Conselho da salubridade da Cidade da Bahia, e Commissario Vaccinador do Municipio de Vianna por S. M. I. &c.&c.




Surgeon Genl's Office
LIBRARY
64264
Washington

MARANHÃO:

TYPE. DA TYP. PEREIRA RAMOS,

Imp. por Viriato Maximo Pereira Ramos.

ANNO DE 1855.





Sociedade de Sciencias Medicas

DE

LISBOA.



AO

Conselho de Salubridade

DA

BAHIA.



O. D. C.



Author.

Journal de l'Académie des Sciences

1788

ALPHABETIQUE

1788

Journal de l'Académie des Sciences

ALPHABETIQUE

1788

1788

1788

PROLOGO

Não sabe a luz este pequeno trabalho para alardear sciencia, porque de sobra conhecemos a deficiencia de nossos conhecimentos medicos, e a mesquinhez de nossa capacidade intellectual.

O amor proprio não nos offusca a razão a tal ponto, e louco seríamos se tal intentassemos n'este seculo, que a porfia tem sido tão illustrado por tanta luz derramada em tão grande numero d'obras notaveis, escriptas por pennas tão habéis quanto ricas de talento e saber.

O nosso fim é tão somente mostrar o desejo que temos de concorrer com o nosso fraco contingente para a prosperidade do nosso paiz. e se temos consciencia de que este trabalho é imperfeito, com tudo parece-nos que nos lugares, onde ha carencia de medicos, elle pode servir d'alguma utilidade, e é esta a unica recompensa, que esperamos colher de nossos bons desejos.

Do publico e de nossos illustrados collegas esperamos indulgencia, e correcção para os nossos erros: não voltaremos o rosto a qualquer critica sendo ella em termos decentes e com as armas do raciocinio e no campo da sciencia.

Vale.



1890

The first of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The second of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

The third of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

1891

The first of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The second of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

The third of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

The fourth of the year was a very wet one, and the crops were much injured. The weather was very cold, and the ground was very wet. The crops were much injured, and the people were very poor.

The fifth of the year was a very dry one, and the crops were much injured. The weather was very hot, and the ground was very dry. The crops were much injured, and the people were very poor.

CLIMATHOLOGIA.

É a parte da hygiene publica, que trata da descripção, e variada influencia do clima sobre o physico e moral do homem, exercida por diferentes agentes, como calor, luz, electricidade, humidade, natureza do terreno, sua latitude, produções etc.

As variadissimas modificações physicas, e moraes, que a especie humana apresenta por todo o globo, são sem duvida devidas ao seu influxo, como Hippocrates bem o julgou na antiguidade, e Montesquieu, mais modernamente, a considera como tendo uma particular ascendencia na indole, e disposição moral dos povos.

O nome *clima* significa *região*, e deriva-se d'uma palavra grega, que exprime, ou quer dizer inclinação do céu; e effectivamente a inclinação da terra attribuida em linguagem vulgar á inclinação do sol é a cauza da variação successiva, e directa do sol, d'onde resulta serem os dias maiores, ou menores, e outras muitas condições climathologicas. A maior parte dos AA. define clima—a Zona, ou região comprehendida entre dous circulos parallelos ao Equador.

Esta definição é defeituosa por assentar na latitude de região, por isso que o mesmo parallelo pode comprehender regiões, que differem nas suas condições meteorologicas: assim vê-se, que em latitudes iguaes a Asia e a America são mais frias, que a Europa; que no mesmo hemispherio as regiões de Leste no centro dos continentes são mais frias, que as regiões d'Oeste; o contrario do que s'observa nas regiões insulares. Nós definiremos clima a região, ou extensão do Paiz, na qual a temperatura, e as outras condições atmosphericas são identicas.

Os Geographos antigos tomarão por base da divisão dos climas a maior, ou menor extensão do dia; em consequencia do que dividirão o espaço, que vae do Equador ao Polo em trinta climas; do Equador ao circulo Polar em 24; e do circulo Polar ao Polo em 6. Aos primeiros denominarão clima de meia hora, porque no solsticio do verão o dia cresce mais meia hora—principião no Equador, e terminão onde o dia mais comprido tem 12 horas e meia. Aos segundos denominarão de mez, porque em cada um o dia augmenta um mez; existem nas Zonas glaciaes, e terminão em todo o parallelo, onde o sol está no horisonte um mez cabal, dous, tres, etc., até chegar ao Polo, onde o sol não se occulta 6 mezes seguidos.

Esta divisão é sem valor, porque é indifferente para a saude de qual-quer população, que os dias cresçam meia hora, ou mais.

Os modernos dividirão o espaço comprehendido entre o Polo e o Equador em 90.°, augmentando assim o numero dos climas. Esta divisão também caduca; porque as condições physicas, e meteorologicas, que influem na saude do homem, não se accommodão á similhante divisão.

Hartinann dividio os climas em continentaes, e insulares, fundando-se em que estas ultimas regiões são notaveis pela uniformidade de sua temperatura, e as primeiras pelas suas variações atmosphericas.

Esta divisão é infundada, porque os continentes, e insulas varião em quanto ao grão de calor que recebem. Assim parece ser absurdo comprehender no mesmo clima uma Ilha collocada no Equador, e outra no Polo, só por não serem tão sujeitas, como os continentes, a variações atmosphericas.

Humboldt quiz estabelecer regiões, em que o termo medio do calor não variasse sensivelmente: este systema, que á primeira vista parece ser razoavel,

não é, porque as linhas, que as limitão, devião ser parallelas ás latitudes geographicas, o que não acontece, e porque o sól não se distribue com uniformidade decrescente do Equador para o Polo por circumstancias meteorologicas, geologicas, e muitas outras, que imprimem variaveis inflexões á essas linhas, conservando-se sómente parallela na Zona-torrida, o que faz que o hemispherio boreal receba mais calor, que o austral.

A' vista do exposto, dividiremos os climas em quentes, frios, e temperados, por ser esta divisão a mais adoptada e conducente com o estado actual da sciencia. Os primeiros caracterisados por um excessivo calor, devido a direcção perpendicular, com que os raios solares cahem sobre estes Paizes, estendem-se em um e outro hemispherio desde o Equador ate 30. ° de latitude austral, e boreal; comprehende toda a Asia, e America Meridional, uma grande parte d'Africa, Nova Hollanda, e da Nova Guiné, uma parte d'America Septentrional, e um grande numero d'Illhas etc.

Nestas condições climaticas existe o nosso Paiz, constituindo uma vasta região da America Meridional, que em grande parte s'acha collocada debaixo do tropico de Capicornio entre 37, e 68. ° de longitude Oeste, segundo Milliet de Sant Adolphe (a) e segundo D. José de Urcullu entre 37, e 75. ° Estende-se da extremidade Norte do Pará á extremidade Sul da Provincia do Rio grande do Sul, entre a linha Equinoxial e o 33. ° de latitude Sul, e tem por limites ao Norte o Oceano Atlantico, as Goianças Franceza, Ingieza, e a republica da Colombia; ao Oeste o Perú, Bolivia, Chili, e o Estado Independente d'Entre Rios; ao Sul, o Estado Oriental, e o Oceano Austral; e á Leste o mesmo Oceano, e o Equinoxial. Foi descoberto em 1500 casualmente por Pedro Alvares Cabral, que ali fora lançado por uma tempestade, quando viajava para a India, depois de ter dobrado o cabo da Boa-Esperança. Desde então ficou pertencendo a Corôa Portugueza, que o repartio em diversas Capitania, das quaes se fez doação á particulares, e o restante da costa foi invadida por aventureiros.

Tal é resumidamente até esta data a historia da fundação do Imperio da Santa Cruz, de que a Provincia do Maranhão pela sua civilisação, agricultura, e industria, constitue um dos seus mais bellos ornamentos.

Esta Provincia que conserva o nome primitivo do Rio Amazonas, achase situada ao Norte do Brasil entre os parallelos meridionaes de 1 ° 18' e 11 e 30' tem por limites á Leste o Piauhy, ao Oeste o Pará, ao Sul Goyaz, ao Norte o Oceano Atlantico: foi descoberta pelos Irmãos Vicente Yanes, e Ayres Pinson no começo do seculo 16, que encontrarão á morte no seio das agoas do primeiro rio do Mundo. D. João III fez doação desta parte ao celebre historiador João de Barros, o qual em 1535 preparou uma expedição composta de 10 Navios armados em guerra, 900 colonos, 113 ginetes, grande numero d'animaes domesticos, e immensa quantidade de provisões de boca, e de guerra, a qual sossobrou na costa desta Provincia.

Em 1594 um Francez chamado Rifaull naufragou nas proximidades da Ilha, o qual tendo sido bem recebido pelos Indios, pôde concertar um Navio com os restos dos outros, no qual mais tarde voltou a França, e communicou á Henrique IV, o qual enviou Rivardiere á observar á Ilha: este de volta de sua missão soube que Henrique IV havia sido assassinado, o que não obs.

(a) Diccionario Geographico e historico do Imperio do Brazil tradusido pelo Doutor C. Lopes de Mouta.

tante a Rainha Regente fez apromptar trez navios de guerra com 1.200 homens, que desembarcarão na Ilha em 20 de Julho de 1612, e se juntarão com alguma gente do Rifault, que tinha ficado na Ilha.

Edificação cazas e um forte com 20 peçass d'artilleria, que teve o nome de S. Luiz, em honra de Luiz XVIII então menor.

Tal é em resumo a origem e fundação da bella Cidade do Maranhão, cercada pela bahia de S. José ao Oriente, e de S. Marcos ao Poente, e separada do continente pelo rio Mosquito: sua superficie é mais alta que á deste, e della brotão 15 mananciaes d'agua, os quaes filião outras tantas torrentes, das quaes as mais principaes são os rios do Maranhão, de S. Francisco, do Anil, o Anodimba, Bacanga, Combico, Cuti, Guarapiranga, Itaphen, Jacuarema, Maio-ba, Tapari-Assu, e Vinhaes.

E' esta Ilha uma Comarca da qual é cabeça a capital da Provincia: segundo o Doutor Lopes Moura a sua população até 1845 era de 408000 almas: á qual de necessidade deve ter augmentado nestes dez annos. O terreno da Provincia é geralmente baixo, e argiloso, como bem se observa nas barreiras do baluarte, praias do cajú, S. Antonio, em toda a Ilha, e territorio da Comarca da Cidade de Vianna; em grande parte cuberta de enormes, e incultas matas, e cortada por numerosos rios, dos quaes brotão variaveis correntes, que entretcem não pequeno numero de lagoas, que exuberando pelo inverno dão lugar á numerosos charcos: pelo que se vê, se acha collocada na Zona torrida, e pelas condições supra expostas, deve ser humida e pantanosa a Ilha, e em geral a Provincia.

O termo medio da temperatura deste, e outros Paizes desta ordem oscilla entre 25, e 35 ° R. annualmente. Os segundos caracterisados por um extremo frio estende-se desde 55. ° de latitude até o Polo.

Os terceiros por apresentarem o termo medio entre ambos, ou os caracteres dos climas calidos, e frios, sem serem em extremos, se estendem entre os 30 e 55. ° de latitude austral, e boreal.

A' esta divisão pode-se objectar, que estes climas confundem-se nos extremos, por que o calor decresce mais, ou menos do Equador para o Polo. Em verdade não podemos negar, que acontece o mesmo, que em todas as divisões da Natureza, que sendo perfeitamente caracterisadas no centro nos extremos confundem-se com as divisões vizinhas; porem abstrahindo-se dessas variações locais, e considerando-se o phenomeno no maior ponto de sua manifestação veremos, que não ha um só ponto no globo, que não possa ser mais ou menos razoavelmente incluído em alguma das tres divisões.

Em qualquer ponto do globo poderemos notar a serie do climas, que assignalamos do Equador para o Polo, se considerarmos no sentido vertical: assim qual quer elevada montanha apresentará na sua base o clima da latitude, em que existir plantada, cuja temperatura irá diminuindo gradualmente para a parte superior á ponto de no seu cume representar as regiões Polares.

Se observarmos, por exemplo, qual quer agigantada montanha do mesmo Paiz, veremos a sua base revestida de rigosa, e luxuriante vegetação dos tropicos, que para a parte superior irá degenerando, e mudando em vegetação propria das Zonas temperadas, até que por fim alguns raras espiçeiros representarão o feio, e triste aspecto dos climas glaciaes, e o seu mais elevada cimo se achará cuberto de neve, e por consequencia do mais intenso frio.

Por tanto vê-se, que ha uma grande simillhança entre o clima e a vegetação geral do hemispherio, considerado de Equador para o Polo, e o clima

a vegetação d'uma grande montanha, considerada da base á sumidade. Assim foi, que com indizível sagacidade Mirbel comparou o globo terrestre á duas montanhas, unidas pela sua base e reunidas no ponto correspondente ao Equador.

Efectivamente podem-se traçar linhas parallelas ao Equador, alem das quaes o clima, e um certo numero de especies deixarão d'existir, porem isto mesmo até certo ponto pode falhar, por que causas poderosas podem diversamente modificar.

Causa admiração vêr os seres vivos da Natureza dessiminados desde o Equador até 75.º de latitude, sobre tudo se reflectirmos, que no primeiro destes climas, ali incluídos, o thermometro pode se elevar a sombra a 35, e mesmo a 48.º; e que nos segundos desce 50, e mesmo 57.º o maximo. Pelo que se vê, que os seres vivos, sobre tudo a especie humana, são dotados d'uma elasticidade flexibilidade organica, que se amolda mais ou menos ás diferentes variações climatericas, porem a sua existencia na superficie da terra é compativel até certa altura da atmosphera, limitada por essa elevada, inhospita, e mortifera região de gelo, que representa uma curva ingente, que vae decrescendo, ou abaixando do Equador para o Polo.

Segundo Humboldt e Wilson esta climathologia é graduada da forma seguinte: no Equador a cada 219 metros de elevação na atmosphera o thermometro desce um grau: nas Zonas temperadas em cada 174 metros um grau: no inverno faz differença de 70 metros pelo menos. Assim no Equador a neve so se formará á 2460 toezas de elevação na atmosphera, em quanto que na Noruega, e Succia, existe constantemente formada a 700, e 800 toezas.

Se consultarmos á Historia Natural veremos as variadissimas, e profundas modificações impressas pelo clima, tanto no reino animal, como no vegetal.

Assim nos climas calidos encontra-se uma variedade espantosa de animaes maníferos, os mais monstruosos, como o Elephante, Camelo, Hippopotamo, etc; os mais ferozes, e carniceiros como o Tigre, e o Leão; os mais astuciosos, e lubricos como o Macaco, e outros: as mais ciueintas, e magestosas Aves de Rapina, lindos passaros, e delicados passarinhos, admiraveis pelas suas formas variadas elegantes côres, e pelos seus maviosos, e sonoros cantos: os mais venenosos reptis como as Serpentes; e um numero infinito de insetos, e vermes: os mais formidaveis, e sanguinarios peixes, como o Tubarão, Mero, e outros. O reino vegetal ostenta a mais profusa, e consideravel variedade d'especies de novos generos e familias, e onde se encontrão as mais corpulentas, e agigantadas arvores, os mais formosos arbustos, e tenraservas, ornadas das mais bellas, mimosas, e aromaticas flores, e é nestas regiões, onde o reino vegetal tem fornecido, e fornecerá innumero recurso d'utilidade ao progresso das sciencias, e artes; e o mineral ás mais preciosas pedras, e variaveis productos. A' proporção, que transita-se do Equador para o Polo, vê-se o reino animal ir depreciando-se em formas, e variedades, e o vegetal escusando-se de profusão, e despojando-se de suas elegantes, faustosas, e variadas formas para assumir as mais humides, e simples, e mesmo terminar ou desaparecer completamente, ogo que o rigor do clima impõe obstaculo ao seu desenvolvimento.

Terá o clima alguma influencia sobre o physiolo, e moral do homem? Parece fora de duvida, segundo a opinião dos mais celebres observadores, porem não tão exagerada como alguns querem. É notavel a influencia dos climas quentes sobre seus habitantes. Assim vê-se, que a acção immediata do calor excita, ou exalta as funções dos órgãos, e aparelhos perifericos, e in-

fraquece a dos centrâes, o que faz com que a circulação seja activa e a respiração fraca, e frequente. Por isso que o ar quente, e sobre todo o secco, sendo mais raro e leve, contém, em um volume dado, menos materiaes respiraveis, pelo que não pode fornecer ao pulmão em cada inspiração a quantidade d'oxygénio, para que a ematose se effectue completamente; em consequencia do que augmentará o numero das inspirações para o pulmão obter pela frequente repetição deste acto, o que perde pela exiguidade desse elemento componente do ar, tão preciso á respiração, do que resulta a actividade da circulação para receber a quantidade d'oxygénio necessario á boa sanguinificação, fonte perenne da nutrição, que enfiacuecida ou perturbada leva a desordem as outras funcções, e por tanto á todo o organismo.

Copeland fallando da respiração diz, que a porção do acido carbonico expirado é menor nos climas quentes: Georget pretende, que a fraqueza respiratoria dependa mais da debilidade dos musculos inspiradores, do que da rareficação do ar, em quanto que á nós parece depender d'ambas estas condições.

A força assimilatrix do estomago é sensivelmente fraca, do que resulta ser a digestão lenta e trabalhosa, e por consequencia a nutrição má, o que auxiliado pela exaltação da excessiva transpiração cutanea faz, que os habitantes destes climas tenham pouco desenvolvimento physico, a força muscular pequena, e fraca, e sejam mais ou menos palidos ou descorados. Desta exaltação Johnson faz depender a exaltação do figado, e Annesley quer, que a actividade deste seja para substituir a indolencia do pulmão, e eliminar sob a forma de bilis e carbono, que não poudeser expellido pela respiração.

O calor, em um grão determinado, é um dos mais poderosos excitantes da exaltação da sensibilidade; mas sendo em extremo diminue, e até destróe a excitabilidade do apparelho nervoso, e as vezes á um ponto tal, que o cerebro e os outros órgãos perdem a sua energia, e tornão-se indolentes, preguiçosos, inertes, e improprios ao trabalho de suas funcções, resultando por consequencia serem os habitantes destes climas excessivamente nervosos, e pouco aptos para o exercicio d'espírito, e fadigas corporaes e propensos a gastar a vida com uma actividade espantosa, nos excessos, e praseres provocados pela ardente excitação do clima. Assim os homens envelhecem cedo, e são raros os que chegão a 60 annos, e as mulheres mal sahudas da infancia tornão-se aptas á ser mães, e prematuramente perdem sua frescura, e belleza, e extemporaneamente envelhecem.

Sendo o figado e a pelle os órgãos mais sujeitos a acção deste clima são de necessidade os mais propensos á acção das molestias. Assim são frequentes as doenças de pelle, as affecções do figado, as dos órgãos digestivos, as hemorragias, as affecções cerebraes e nervosas, as chronicas, as febres graves, sobre tudo as intermittentes, e quasi todas as molestias complicadas de symptomas ataxicos, ou adynamicos. Nos habitantes dos climas frios concentra-se toda a acção do clima no pulmão e estomago, do que resulta grande energia ao apparelho respiratorio, digestivo, notavel desenvolvimento muscular, e serem activos, braves, e viverem mais tempo, que os dos climas quentes. As mulheres envelhecem mais tarde, e mais tarde perdem a faculdade de procrear, e a sua longevidade é maior.

As molestias, que são variaveis, quasi sempre revestem o caracter inflammatorio.

Os habitantes dos climas temperados não tem o vigor dos Septentrionaes, e nem a exaltada sensibilidade dos habitantes das regiões calidas: sua organis-

ção, e junções se achão equilibradas no centro das influencias dos outros climas, o qual, durante o inverno, reflecte a sua maior energia nos órgãos da respiração, e digestão, e no verão ao aparelho hepatico, e cutaneo, e á uns e outros na primavera, e outono. O caracter das molestias é dependente da natureza mais ou menos quente, secca, ou humida das estações.

E' este o clima mais proprio á habitação dos homens, e ao seu desenvolvimento physico, e intellectual, e a sua longevidade é comparativamente maior. Segundo alguns authors, as Nações collocadas nessas regiões, isto é, assentadas entre 30. e 50. ° de latitude Septentrional, apresentão-se mais ricas d'intellecualidades, do que as mais proximas ao Polo, ou Equador. porém esta asserção é gratuita, por isso que a historia prova, que em varios pontos do globo tem existido, e existem populações ricas d'intelligencia.

Não queremos obscurecer, que os climas Polares podem entorpecer os órgãos, e embotar a energia do encephalo; e que os quentes abatem, enervão, e afloão o corpo, exgotão, e amortecem o espirito.

Polavia existem, como sabemos, em muitos pontos dessas regiões Nações ostentando a mais apurada civilisação, e a mais ingente intellectualidade: sirva-nos d'exemplo o nosso Paiz.

Influirá o clima na actividade das paixões? Assim parece: basta comparar-se a activa vivacidade dos habitantes dos Paizes Meridionaes com a quèla, fria, e imperturbavel flangma dos habitantes do Norte. O extraordinario ardor das paixões, a excitação de certas qualidades moraes dos climas quentes até parecem reflectir-se aos animaes, que, como vinhos, é onde existem os mais bravios, e feroses.

A exaggeração da imaginação é activa nestes Paizes, e é, segundo á historia, onde se tem visto o mais elevado preconceito e fanatismo, e mór exaltação politica, e religiosa.

Desejára a influencia do clima na propagação da especie humana? É problematica, e quasi que irresoluvel por falta de estatisticas regulares de diferentes pontos do globo, porém alguns authors querem, que a fecundidade seja em relação a mortalidade.

Segundo Levi a fecundidade é menor nos Paizes do Norte, que nos do Meio-dia, e a mortalidade igualmente. Porém esta asserção é sem fundamento por se basear em estatisticas circumscripitas, das quaes senão pode deduzir prova para os climas de todo o globo; alem de que se remontarmos ao tempo da decadencia do Imperio Romano, veremos, que do Norte surgirão innumeraveis multidões de Barbiros, Cimbro, Gots, Unos, Vandalos, Francos, e muitos outros, que inundarão esse vastissimo Imperio, á ponto que os escriptores do 5. ° e 6. ° seculo denominarão a essas regiões do Norte—Officina gentium. Com tudo se attendermos, que as populações extremas do Norte são pouco fecundas, como os Lapões, Ostiakos, e outros, como provão os melhores observadores, e que na America, sobre tudo Inglesa, tem duplicado á população, o que no Brazil é palpavel, apesar da falta d'estatisticas, temos, que a opinião de Levi parece ser mais provavel, á não querer-se considerar como causa principal desta circumstancia a extenção, fertilidade do terreno, e outras condições inherentes á essas regiões. Pelo que se vê, que a respeito da influencia dos climas é difficil, e mesmo impossivel obter provas, que rigorosamente demonstrem a fecundidade, e por tanto a mortalidade. O que se deduz da maior parte das observações é, que a fecundidade, e a mortalidade cresce successivamente do Polo para o Equador.

Artemann quer, que os climas insulares sejam mais favoráveis, que os continentaes, á existencia humana. Porém os climas, que mais parecem favorecer, são aquelles, em que não ha excesso de calor e nem de frio, e destes as regiões maritimas. Assim vê-se, que o maior numero da população do globo existe na India, China, Persia, Asia-Menor, Europa temperada, e nas Zonas temperadas da America: o resto existe dessemimada por essas regiões em extremo frias, ou calidas.

Os climas quentes extendem-se, como vimos, desde o Equador até 30. ° de latitude austral, e boreal, e caracterisados por excessiva temperatura, porém esta offerece apreciaveis variações entre o dia, e a noite. Algumas vezes, durante o dia, essas variações são pouco apreciaveis.

Marchando-se do Equador para o Polo, o calor vai decrescendo lentamente, e faz differença de 1. ° de 0, a 10. ° de latitude.

A maior parte dos authores dividem o anno climaterico destas Zonas em duas estações—secca, e humida—na primeira as chuvas são pouco frequentes; e na segunda abundantes. Nestes climas são notaveis as variações barometricas, e observão-se as mais ingentes, horribéis, e tremendas trovoadas, frequentes nos mezes de Maio á Agosto.

São sujeitos a fortes e violentos ventos, ou correntes d'ár, mais, ou menos rapidas, occasionadas por mudanças, que se operão no peso especifico, e elasticidade do fluido atmospherico, por causas, que deslocão uma porção, agitando-a com desigualdade em alguns pontos da atmosphera. Alguns são periodicos e distinctos em annuaes, diurnos, e nocturnos. Os diurnos existem principalmente pela manhã até as 11 horas, ou pouco mais, para retornar das 4 para as 5 da tarde, ou então a noite; raras vezes todo o dia. Os ventos periodicos annuaes são devidos a delatção do ar secco, e ao esforço que, para se equilibrar com elle, faz o ar mais frio das latitudes visinhas.

Além destes apparecem extraordinarios ventos em diferentes regiões calidas. Assim nas costas de Guine ha o Harmattan, que se mostra quatro vezes no anno, e dura termo medio, 15 dias. É quentissimo, e costuma apparecer em Dezembro, Janeiro, e Fevereiro: no Saharo reina o Cinum com tanta violencia, que levanta montes d'arêa á consideraveis alturas: no Egypto ha o Chamsin, que dura durante o equenocio da primavera: nas Philipinas o Colla, dizem ter produzido tremores de terra etc. Todos estes ventos são excessivamente calidos, e fortes. Os povos, que os supportão encaráo-nos como beneficos por purificar o ár de toda a qualidade d'emanações. Alguns authores assegurão, que quando o Harmattan, ou cada um dos outros se mostra, desaparecem as intermittentes, variola, e todas as affecções que reinão epidemicamente. (a)

Estes climas são sujeitos a frequentes chuvas, e trovoadas como dissemos, por isso que sendo a immensa, e movel massa atmospherica d'excessiva temperatura, que vai decrescendo de suas camadas inferiores para as superiores, e achando-se pelas inferiores, effectivamente mais quentes, em contacto com toda a superficie do globo, em grande parte formada de marés, rios, e lagos, as pôem em evaporação apoderando-se de maior, ou menor quantidade de moleculas liquidas, cuja quantidade é sempre em relação ao calor atmospherico, que as pôem em expansão, auxiliada pela agitação da mesma

(a) Compendium de Med. Pratique par Ed. Monneret. et. M. Louis Fleury. tom. 3. ° pag. 381.

massa, entretendo-se assim uma evaporação continua. Pelo que vê-se, que quanto maior for o grão de calor, maior será a saturação do ar pelos vapores, que, sem cessar, se desenvolvem na superficie do globo, os quaes pela sua ligeireza especifica se elevão na atmosphera, e se condensão nas suas regiões mais frias, constituindo-se assim uma sorte de distillação perenne, na qual a agua se eleva em vapores para formar nuvens, nevoeiros, e chuvas.

E' sabido que a temperatura da atmosphera decresce gradualmente á medida, que se afasta da terra. Portanto, os vapores emanados de sua superficie ir-se-hão condensando mais, ou menos, com tanto maior rapidez, e facilidade, quanto mais se elevarem. Porem esta condensação, que talvez, deveria produzir agua liquida, ou solida, não se effectua; parece que logo se converte em vapores formados de pequenas vesiculas, representando espheras deas, aggregadas entre si, e suspensas na parte superior da atmosphera, constituindo, segundo Saussure e outros, as nuvens, que vemos fluctuar sobre nossas cabeças; em quanto variações de pressão, de temperature, de electricidade atmospherica, attração d'altas montanhas, grandes edificios, ou ia-gentes arvores, não as fazem precipitar.

A suspensão das nuvens pode-se conceber admitindo-se a existencia do vapor vesicular, primeiro, porque o ar contido nas vesiculas encerra o maximo de vapor aquoso; o que as torna especificamente mais ligeiras, que o ar, que circunda as nuvens. Segundo, porque o ar, que se acha entre as vesiculas deve conter o maximo de humidade, e por consequencia produzir uma corrente ascensional propria a sueter, e reunir as nuvens entre si: terceiro, finalmente, porque as nuvens recebendo o calorico radiante do sol, durante o dia, e da terra, durante a noite, a sua temperatura deve ser superior a da atmosphera, que a cerca; o que deve augmentar a sua ligeireza especifica. Assim concebe-se, que, durante a acção do sol, as nuvens devem se elevar, e que podem assim chegar a uma região atmospherica mais secca, onde se pode reduzir de novo á vapor, e desapparecer; que se podem formar, ou dissolver, passando d'uma região mais quente para uma mais fria, e vice versa, segundo a corrente do ar, que as entretém. Enfim, que se podem formar subitamente pelo encontro de duas correntes d'ar oppostas.

Por tanto vemos, que os vapores aquosos transportados a altas regiões d'atmosphera se convertem em pequenas vesiculas, que aggregando-se entre si constituem as nuvens; e que logo que esses vapores excedem a capacidade de saturação, que lhes permite o grão de temperatura do ar atmospherico, devem se converter successiva, ou subitamente em agua liquida, ou solida, que cahem da atmosphera em virtude do seu peso especifico, formando-se assim, em consequencia d'uma multidão de causas e influencias pouco apreciaveis, as chuvas, mas que parecem especialmente ligadas á estados electricos dos vapores vesiculares, de sorte, que no momento do contacto, ou d'uma comunicação livre com o sol, as vesiculas aquosas approximando-se se desfazem, e formão gottas, que cahem sobre a terra: é certo, que as centellas electricas que constituem o raio, determinão á resolução das nuvens em liquido, do que resultão abundantes aguaceiros.

Quando o abaxamento da temperatura atmospherica não é sufficiente para fazer transformar os vapores vesiculares em gottas, condensa-os; e assim suspensos nas regiões inferiores da atmosphera, constituem nevoeiros, dependentes do resfriamento noturno, que condensa, e precipita os vapores aquosos; que a atmosphera contém, os quaes pela acção do sol se desvanecem,

por isso que com o augmento do calor cresce a capacidade deste fluido, para receber mais vapores. Pelo que, temos, que o ar á qualquer temperatura receberá vapores, sempre em relação á essa temperatura, isto é, será tanto maior, quanto maior for a quantidade relativa do calor: conservará a quantidade de vapores, que continha, apesar de mudar de lugar, não variando de temperatura; porem se abaixar, a maior parte se precipitará debaixo da forma de chuva, sempre em relação á quantidade de vapores, que existião formados, e ao máximo d'abaixamento de temperatura.

E' por esta razão, que nos climas calidos ha copiosas chuvas, sobre tudo, durante a noite, por isso que, sendo a elevação da temperatura maior durante o dia—maior será a elevação de vapores, que, condensados á certa altura da atmosphera, formão, como dissemos, as nuvens tão abundantes nessas regiões, que pelo resfriamento maior durante a noite tomão a forma liquida, e cahem sobre a terra com mais abundancia.

E' tambem por esta razão, que o orvalho, phenomeno dependente da humidade de ar, forma-se, e precipita-se durante a noite, e com mais abundancia da meia noite ás seis horas da manhã. Foi por muito tempo impossivel explicar o seu mecanismo, por que, permanecendo a terra mais quente que a atmosphera, não podia determinar a condensação dos vapores aquosos do ar, porem a theoria do calorico radiante veio o elucidar.

As folhas dos vegetaes communicando com a terra por intermedio do corpos, máos conductores de calorico, não recebem delle uma porção sufficiente para reparar as suas perdas. As folhas envião constantemente calorico radiante aos corpos, que as cercão, e d'elles recebem igualmente, porem não sendo compassada a porção, que transmite a atmosphera, por cauza do muito frio das suas regiões superiores, resulta, que as folhas se tornão mais frias que o ar, e em consequencia tornão-se aptas para condensar os vapores aquosos da atmosphera em pequenas gottas constituindo-se assim o orvalho, tão abundante nestas regiões.

Dissemos, que as chuvas erão mais regulares e abundantes durante o inverno, e é nessa epoca, que tem lugar as maiores trovoadas, por isso que abundando a atmosphera em nuvens, consideradas bons conductores d'immenso volume d'electricidade, perfeitamente exuladas no meio da atmosphera secca que a cerca, cuja electricidade se suppõem provir da evaporação, que basta para constituir estados electricos, differentes dos da massa donde elles s'elevão. E por que os differentes pontos do globo, d'onde se desprendem esses vapores, podem-se achar diversamente electrizados, e porque emfim no momento da conversão dos vapores, propriamente ditos, em vesiculares, seja possivel modificar-se o estado electrico.

Assim não se achando essa electricidade uniformemente distribuida pelas nuvens, não só em quanto á sua quantidade, mas mesmo em quanto a sua qualidade, tendem a equilibrar-se, para o que reagindo umas sobre outras dão lugar a tres phenomenos distinctos, devidos as centelhas electricas, que se dirigem d'uma nuvem para outra, ou d'uma nuvem para a terra, cujos phenomenos são os seguintes.

Uma luz viva de natureza particular, que constitue o relampago, ao mesmo tempo um traço de fogo, que segue no espaço uma marcha angulosa, constitue o raio, em fim um ruido consideravel, de natureza variavel, que se designa com o nome de trovão, cujo ruido se compõe de uma primeira expulsão forte, e grave, seguida d'intervalles sensiveis e d'outras expulsões successiva

mente mais pequenas, e longiquas, muito semelhantes ao rodar d'uma carruagem: effeitos estes, que, como dissemos, resultão das centelhas, que se dirigem d'umas para outras nuvens e á repetição do ruído, as reflexões produzidas pelas superficies das nuvens constituindo os variaveis echos, ou successivas detonações

Assim por exemplo, temos, que, achando-se as nuvens diversamente electradas, isto é, umas carregadas d'electricidade vitrea, ou primitiva, outras d'electricidade resinosa, ou negativa, tendem a equilibrar-se, resultando por consequencia atracção entre as que se acharem sobre-carregadas de fluido electrico de differente natureza, e a repulsão entre as que contiverem da mesma, provindo em consequencia os phenomenos ja ditos.

A mesma tendencia existe d'equilibrio electrico entre as nuvens, e o sólo; o que terá facilmente lugar s'as camadas inferiores da atmosphera estiverem humidas; então o quilibrio pode se restabelecer sem abalo; porem se estiverem secas, só se restabelecerá por explosões tâes, que a tensão electrica chegue á um ponto, que dê lugar ao raio.

Os phenomenos electricos que se passam entre as nuvens, nem sempre produzem o traço luminoso, e o ruído de que fallamos. Percebe-se muitas vezes, quando a temperatura s'eleva scintillações mais, ou menos brillantes, sem ruído algum, que se podem suppor dependentes de centelhas electricas, muito afastadas, porem parece mais provavel serem devidas ás irradiações d'algumas nuvens isoladas e sobre-carregadas d'electricidade.

E' ponto ainda muito obscurecido na sciencia a electricidade atmospherica, suas variações, segundo os climas, localidades, e outras condições meteorologicas, etc.

Em consequencia do que sua acção sobre o homem não s'acha bem determinada. Julga-se no estado actual, que não se achando o corpo humano exalado, não recebe sua influencia, e que quando a recebe, transmite ao reservatorio commun, ou a terra, que é por excellencia bom conductor. Todavia na approximação das trovoadas muitas pessoas sentem-se oppressas, abatidas, e involuntariamente assustadas; e muitos ha, até sentem cephalalgia, tremores, vomitos, diarrheas, etc; influencia esta mais notavel no estado pathologico.

Assim as feridas e fracturas sentem dores mais vivas e todas as affecções internas, sobre tudo as agudas exacerbão-se; o que parece depender d'um maior grão d'excitação do systema nervoso, ou de certas idiosyncrasias particulares, ou condições d'organisação ainda pouco conhecidas.

Como fica dito, a evaporação é sempre em grande escala nos Paizes quentes, e verificar-se-ha sempre que a atmosphera não se ache perfeitamente saturada de vapores aquosos, dependendo deste phenomeno a humidade do ar destes climas, sem que muitas vezes seja apparente; o que só é manifesto, quando os vapores aquosos excedem a capacidade da saturação do ar.

Segundo Runford e outros, o ar secco, não agitado, é máo conductor de calorico, o que faz, que em igual temperatura o ar humido pareça mais frio, que o secco, porque o primeiro subtrahе mais calorico, que o segundo.

O ar quente e humido pela interposição do calorico, e vapores aquosos contem em um dado volume menor porção d'ar respiravel: a sua acção debilitante já foi indicada por Hippocrates.

Os individuos sujeitos á uma tal condição atmospherica, offerecem geralmente disposições lymphaticas, e todas as funcções exercem-se com muita lentidão.

O effeito noivo e mais saliente do ar quente e humido é favorecer a fermentação, e putrefacção dos restos organicos, e ser excellente conductor de miasmas, e principios deleterios. Por tanto temos, que o calor sendo a cauza immediata da vida, o elemento sem o qual em grão determinado não pode existir organisação possível, é o agente, que nos climas quentes, comparativamente com os temperados e frios, concorre pelo seu excesso para que todas as condições da existencia sejam pouco favoraveis a conservação da vida, por isso que rarefando o ar, ou activando a evaporação extraordinariamente, concorre para augmentar a pouca capacidade d'elle, para ser respirado, e a muita para se infeccionar das exalações mephiticas produzidas pela atmosfera nimamente humida, e activada pela sua exaggerada temperatura. Corroborando-se por esta arte o dito de Ramasine—*talis est sanguinis dispositio, qualis est aer*, quem inspiramus.

Na verdade, um ar por sua natureza pouco respiravel, e impregnado de vapores, e gases deleterios, não pode prestar o necessario elemento para que se dê uma boa sanguinificação, resentindo-se assim o seu laboratorio, não só pela escassez de principios desse ar, como pela mistura d'outros, que por ventura o alterem, ou invenenem, dando-se em resultado alterações mais, ou menos notaveis dos outrosapparelhos da economia, e por consequencia diferentes affecções, entre as quas as mais constantes são em geral as febres intermitentes, remittentes simples, ou perniciosas, as continuas, muitas vezes revestidas de symptomas ataxicos ou adinamicos, as diarrheas, e dysenterias, o que é sem duvida devido a coincidência muito a proposito, que ha nos climas quentes d'extraordinarios pantanos, como attestão os mais celebres observadores, e nós mesmos temos tido occasião d'observar em o nosso Paiz.

Posto que uma temperatura elevada não pareça constituir condição essencial de sua existencia, por isso que existe em regiões muito differentes, todavia não podemos negar que o calor muito fligura na produção dos pantanos, por isso que, como vimos, excitando a evaporação muito concorre para a produção das chuvas, uma das causas, que mais influencia tem no seu desenvolvimento, assim como na energia de sua malevolencia pela proporcionalidade, que existe entre sua acção deleteria, e elevação de temperatura, sobre tudo se o ar quente se achar carregado de humidade, que quasi sempre corresponde, ou é em relação ao grão de evaporação. Por tanto temos, que o calor do clima é o agente, que mais influe, ou predispõe a formação dos pantanos, e por excellencia é o agente da dessiminação, e da influencia, ou actividade nociva dos miasmas, que delles se desprendem. Per isso antes de tratarmos das molestias de que fallamos, diremos alguma couza a respeito dos preceitos, ou regras hygienicas mais geraes, e apropriadas ao clima, para depois tratarmos dos pantanos.

REGRAS HYGIENICAS.

Os habitantes dos Paizes quentes devem procurar de preferencia residir em caszas espaçosas, altas, arejadas, e claras. A forma, e natureza do vestuario muito concorre para a conservação da saude, pelo que o uso deve ser appropriado ao clima. Assim nos climas quentes os vestidos devem ser de flocos leves, não só para permittir a frequente renovação do ar, como porque, sendo apertados, amoldando-se, e comprmindo o corpo, conservão um ar carregado de calorico, e pode occasionar graves accidentes: verdade esta reconfirmada pelos Egypticos, Persas, etc., como bem attesta o uzo de seu vestuario.

Devem sempre preferir o algodão por não irritar a pelle, não embeber o suor, e ser máo conductor de calorico. Os alimentos devem ser pouco substancias, e de facil digestão: o regimen animal exclusivo é prejudicial; deve sempre ser misturado com o regimen vegetal, assim como devem ser pouco carregados de condimentos, ou temperos excitantes: a côr palida, e a indolencia dos habitantes destes Paizes, tradusem bem a necessidade deste preceito. Devem ter parcimonia, e nunca abusarem das bebidas fermentadas, e especialmente das alcoolicas, e faserem uso das bebidas refrigerantes, e agoa de boa natureza. Os banhos frios, sobre tudo pela manhã, são de grande utilidade, porque alem da limpeza, e subtracção de calorico, tonifica a pelle, e facilitão as funcções.

Devem tambem evitar a acção dos raios solares, principalmente durante a sua maior intensidade, tendo sempre o cuidado de preservar a cabeça de sua immediata acção.

Em todos os Paizes quentes é geralmente reconhecida esta necessidade, como bem attestão os turbantes dos Orientaes, e as largas abas dos chapéos dos Indios, e Chinezes: o exercicio deve ser moderado, como bem indica a indolencia dos habitantes; o abuso dos praseres venerios é prejudicial. Todos os individuos robustos, e sanguinios, sobre tudo os comilões, devem ter em vista estes preceitos. Quanto á acclimação ou resultado pelo qual o homem, que muda d'um para outro clima, adquire, á respeito das influencias do que vae habitar, uma reacção similhante aos habitantes desse clima, temos, que, alem das regras hygienicas prescriptas, quando qualquer mudar de clima, se fizer grande differença o que deixa d'aquelle que vae viver, deve procurar antes habitar o clima intermedio, assim como deve ter muito em vista, sobre tudo á principio, a natureza, e qualidade das substancias alimentares.

() seu alimento deverá ser quasi exclusivamente de vegetaes, e somente duas vezes ao dia, e fugir de todos os estimulantes. Aos recém-chegados convem as bebidas acidulas, e só vinho misturado com agoa.

A acclimação nestas regiões é difficil, especialmente para as crianças; e ainda mais quando a mudança é d'um clima muito frio para um muito quente.

Rochoux avalia o tempo necessario para a acclimação em dous annos pelo menos, porem realmente é difficil fixar-se por variaveis circumstancias, e mesmo é d'observação, que ha organizações refractarias, que ou succumbem logo, ou veem a difinhar lentamente d'alguma affecção de figado no tubo digestivo.



SEGUNDA PARTE.

PANTANOS.

Pantano á que os Latinos chamão—*Palus*, lodo, lama; isto é, terrenos cobertos por massas mais ou menos consideraveis d'agoas immoveis, estagnadas, ou enxareadas, onde vivem, e morrem animaes, e vegetaes, que pela acção do calor entrão em fermentação putrida, cuja operação mecânica dá origem á reacções chimicas, das quaes resultão certos principios, que, pondo em jogo suas affinidades, muitos delles se combinão, e dão lugar a compostos, os quaes de concorrência alterão essas agoas, que pela acção dos raios solares evaporão-se e concentrão-se, dando lugar por esta arte a evolução de corpusculos minimos e imperceptiveis miasmas, que posto em contacto com a economia, e absorvidos, tantos estragos fazem sobre o physico, e moral do homem, realisando-se assim o dito de Reverio fallando das agoas estagnadas—*crassæ sunt, crudæ, et sæpe malignæ, ac pestilentæ*.

Differentes são as causas geradoras dos pantanos em geral, porem limitar-nos-hemos á apresentar as que figurão na producção dos desta localidade, que, segundo o nosso modo de vêr, são os seguintes: a pouca ou nenhuma inclinação do sólo baixo, e desigual, que, por sua natureza argilosa, e disposição, faz com que as agoas meteoricas, não podendo infiltrar-se, nem tão pouco escoar-se, accumulem-se por diferentes partes, e em muitas reforçadas pelas agoas, que brotão do interior da terra. Porem as que mais ingerencia parecem ter em sua producção, e entretenimento, são as do famoso Rio-Panaré, nome indigena, hoje corrupto em—Pinaré, ou Pindaré—que dizem derivar-se de—Panarés—peixes, que antigamente muito abundavão neste rio, de origem desconhecida, mas que parece provir d'Oeste, e d'um nível superior ao de toda esta região, sendo em partes bastante raso, e estreito, e em outras fundo, e em algumas obstruido por enormes balseiros. Alem disto apresenta circunvoluções, ou tortuosidades taes, que, quando por elle se navega, á prôa da canôa, se dirigida ao Oeste é levada mais ou menos para Norte ou Sul, ou para Este, segundo a feição e grandesa da curvatura do estirão do rio, o qual, durante o verão secca extraordinariamente, não só onde faz junção das suas agoas com as do mar, como tambem entre Monção, e as duas novas Colonias, ou Aldêas indigenas domesticadas, á ponto d'interceptar as communicações. No Inverno recebe mais agoa do que é compativel a sua capacidade, a qual, não podendo ter a velocidade de corrente precisa para seguir a rota do rio, e ir lançar-se ao mar, pelas causas ditas, em grande parte extravasa-se pelas margens, ou insinua-se por braços, que as conduzem para diferentes lagos, e lugares mais baixos, onde se vão accumular em tanta copia, que pela sua repleção, partes por onde se trazita pelo verão á pé, ou a cavallo, pelo inverno só se pode fazer embarcado, mesmo em grandes embarcações. Por tanto vê-se, que causas poderosissimas concorrem para tornar este territorio nimia-mente paludoso, e sua constituição atmospherica ingentemente insalubre.

Os pantanos em quanto a sua composição dividem-se em pantanos d'agoa doce, e pantanos d'agoa salgada. Os primeiros são produzidos por diferentes causas, como dissemos; os segundos são geralmente constituídos pelas agoas do mar, e tambem podem ser pela mixtão destas com aquellas. São estes ultimos, que sendo os mais maleficos se dão neste territorio, cuja forma-

ção s'opera da maneira seguinte. Durante o verão, sendo pequena a quantidade d'agoa no rio Pinaré, e quasi que insensivel á sua corrente, succede, que não podendo apresentar conveniente reacção a corrente das agoas do mar, sobre tudo nas grandes marés, que invadindo o rio o penetrão livremente levando d'involta, ou mistura as suas agoas para invadirem muitos lagos, charcos, e baixas; o que se effectua pelos muitos braços que do rio communicão a essas partes, como dissemos. E iria mais longe a invasão desta nociva mistura, se os creadores, e lavradores de commun accordo não a prevenissem, mandando construir tapagens, ou especies de diques. Infelices delles se assim não praticassem! Porque os inconvenientes de seus perniciosos effeitos, serão manifestamente maiores, como bem comprovão as observações d'Orlandy, Caetano Georgine, e outros, cujos effeitos Cerres attribue á exhalações miasmáticas, provenientes da putrefacção dos animaes, e vegetaes, que morrem nessa mixtão, em consequencia da mudança de condição d'existencia dos habitantes dessas differentes agoas. Alem de que incontestavelmente succederia, que a creação da maior parte do gado vaccum e cavallar pereceria á sede nesses campos, e em muitos estabelecimentos ou fazendas se supportarião não pequenos incommodos, e privações.

Os pantanos em quanto a sua duração dividem-se em temporarios, e permanentes. Os temporarios são aquelles, que só durante uma parte do anno contem agoa, e que pelo Estio desaparecem totalmente por escoação, evaporação, ou pelos trabalhos do homem. Os permanentes são aquelles, que ainda que diminuão no verão nunca se seccão de todo: uns, e outros existem com exuberancia neste territorio.

Os segundos são formados por charcos dessiminados por toda a parte, e pelos seguintes lagos, a partir de Leste para Oeste; Fugidos, Itans, Nóvo, Aquily, Vianna, Maracassuné, Cajary, Capivary, Mureti-atá, Lontra, Formoso, Jacarary-pequeno, Jacarary-grande, Acará, Pirage-ninháua, etc.: são estes os mais notaveis pelas suas extraordinarias dimensões; alem destes, outros existem inferiores. Todos elles no inverno communicão-se entre si, e com o rio, e uma grande parte delles durante o Estio mesmo. Nunca se seccão completamente no verão, e durante o inverno se enchem desmesuradamente á ponto de transbordarem por esses immensos campos, e assim os inundar, o que auxiliado pelas agoas extravasadas, e levadas do rio Pindaré para esses lugares, forma-se assim uma massa de infinita extensão d'agoas estagnadas, que avaliamos em trinta léguas quadradas, pouco mais, ou menos.

Os primeiros são constituídos pela superficie de todos os campos inundáveis durante o inverno. Os pantanos podem assentar em terrenos siliciosos, silicócos, e de differentes naturezas, porem a base de sua predilecta eleição é o argiloso, como s'observa nos pantanos da Italia, Hollanda, e muitos outros lugares. Os que offerecem este fundo são os mais terriveis, o que se pode suppor devido á sua pouca observancia. Sendo pela maior parte o sólo deste territorio de similhante natureza, é o que presta-se a formar á base, ou fundo dos pantanos, cuja superficie é na maior parte revestida d'uma especie de turfa, ou camada limosa, d'apparencia aveludada, ou floconosa, bastante espessa, mais ou menos movei, e de cor esverdinhada em certos pontos; n'algunas parda, escura, e enegrada; e em outras mais, ou menos variegada: parecendo formada pela mistura intima dos restos organicos d'animaes, e vegetaes. Alem disto vê-se em differentes partes immersas nesse lodo caules de formas variaveis, e extravagantes em differentes direcções, de plantas aquaticas, e immen-

sos troncos d'enormes e agigantadas arvores, ali lançadas pelas trovoadas, ou arremessadas pelas correntes: disposição esta observada por Barthez em muitos pantanos da Hungria, e Italia; e por Buffon nos de Frisa, Saboia, e mesmo nos da Hungria. Todos estes objectos referidos imprimem á seus fundos um aspecto medonho, e desagradavel á vista. Sobre a superficie dessas agoas em umas partes limpidas, em outras turvas ou escuras, vê-se muitas vezes uma tén, ou pellicula resplandecente, d'apparencia setosa, ou vellosa brilhar ao sol, affectando côres variaveis, e desfasendo-se facilmente a qualquer ligeira pressão.

Em muitos destes lugares exala-se principalmente durante á tarde um cheiro excessivamente fetido, e mesmo a qualquer hora, sobre tudo quando se mêche; constantemente durante a vasante, algumas vezes com tanta intensidade, que se faz sentir á grandes distancias, devido á putrefacção dessa vigorosa vegetação de plantas toxicas, ou virosas, que constituem a Flora pantanosa, e a uma immensidade d'Infusorios, Zoophitos, Vermes, Molluscos, etc., os quaes pela falta d'agoa tão precisa á sua conservação morrem, e entrão em fermentação, dando lugar a evolução desses gazes de cheiro fetido, sordido e nauseabundo.

Quanto a seus effeitos perniciosos são, e teem sido em todos os tempos o objecto do mais que bem justificado terror, e das mais aturadas perquizas d'abalizados Medicos. Terror esse, que originou immensas opiniões e excitou a exaggeração do fanatismo, a ponto de que os primeiros homens representavam esses effeitos allegoricamente, e os consideravam como o mais terrivel inimigo da especie humana.

Os Egyptios representavam-no com o nome de monstro Tyfon: os Gregos designavão pelos nomes, que literalmente significão agoas corruptas, limo fetido; tambem lhe davão a forma de monstro. Hercules foi chamado Lerneus, por ter morto a Hydra de sete cabeças dos pantanos de Lerna, que sim-bolisava os measmas paludosos. Aristoteles chamava—mater putredinis. Os Sacerdotes Druidas, e muitos povos da antiguidade—bocas infernaes. Não inspirava menos terror aos antigos Romanos, tanto, que a adoração á Deosa Menhites e Cloassine, era devida a influencia dos Paúes.

A promulgação de leis a este respeito faz conhecer a importancia que lhes davão: assim Denys d'Halicarnasse pretende, que os Censores despen-savão em um anno mil talentos, para faser esgotar as agoas.

O mesmo pretende, que uma das principaes funcções dos Edis era inspec-cioniar cuidadosamente as agoas, para o que tinham as suas ordens Inspectores, ou Guaras, que denominavão, Hydro-phylaces, sive aquarii.

Diz mais, que penas severas existião contra aquelles, que empregavão os fundos destinados para este fim em outros uzos, por muito uteis que fossem; assim como contra aquelles, que deixavão estagnar agoas em seus terrenos.

Entre os antigos Reis da França, se cita o Rei da Gobert, que impunha graves penas a quem fosse convencido de ter sujado uma fonte, ou corrompido as suas agoas.

Pelo que se vê, que o effeito pernicioso dos pantanos foi objecto de tradições religiosas, e das mais bem ajustadas, e sabias medidas, porem quem primeiro tratou da discripção de seus effeitos d'um modo mais preciso, e scientifico, foi Hippocrates, há vinte dous seculos, cujas discripções teem sido confirmadas por Medicos, que ulteriormente os hão observado nas mesmas regiões, os quaes posto que se possam modificar por circumstancias particulares á qual-

quer localidade, com tudo ha certos caracteres, que nunca se perdem se não com o melhoramento, sem o que são sempre communs aos habitantes os caracteres physicos e moraes, de forma, que a natureza parece apresentar um typo específico, e característico.

Os habitantes dos lugares pantanosos são geralmente dotados de constituição fraca, temperamento lymphatico, mais ou menos bem pronunciado. A sua estatura é pequena, e são ordinariamente valetudinarios. A pelle secca, baa, palida, ou livida, e em muitos amarellada.

Algumas vezes apresenta uma edemação repulsiva, olhos amortecidos, o sem expressão, mãos dentes; voz, mais, ou menos rôuca, pouca energia de funcções digestivas. As viceras abdominaes vão tornando-se hypertrophia. das a medida, que vão sendo accommettidas das febres endemicas, que dão lugar á alterações de figudo, baço, e muitas outras; envelhecem, e morrem prematuramente. Muitas vezes a economia assim deteriorada transmittre o germen de protrahidos padecimentos, e mesmo da morte a sua progenie, legando temperamentos lymphaticos, e idyosincrasias particulares.

Baillon fallando a este respeito diz, "on herite de maux de ses parens, comme on herite de leurs biens, et ce funeste heritage se transmet d'une maniere plus sure encore que l'autre."

Estas decomposições, ou alterações physicas são quasi, que identicas nos infelices habitantes desses immundos brejos; assim veja-se a descripção dos habitantes da Baixa Bresse, e da Brenne, os do centro e Este da França, e os das planicies pantanosas das Indias Orientaes, d'Africa, America etc. A este estado de degradação physica se liga um similhante moral, ipesar deste depender d'um grande numero de cauza modificadoras, todavia os habitantes destes lugares são de character triste, indolentes, pusillanimes, ignorantes, supersticiosos, pouco industriosos, e rutineiros, dotados de pouca sensibilidade, o que os faz indifferentes, e mesmo grosseiros. Tanto assim, que Foderé fallando da inensibilidade dos habitantes das regiões pantanosas, e do centro e Este da França, diz, que não ha riso junto ao berço dos que nascem, e nem pranto sobre o tumulo dos que morrem (a). A sinceridade é nulla, ou quasi nulla, a má fé é espantosa: é nestes lugares onde existe muita libertinagem, e perfidias, sobre tudo conjugaes, e enfim os crimes premeditados, etc. Tal é o triste e misero quadro, que os authores com a maior justiça, e uniformemente, não feito do lastimoso viver das populações sujeitas a acção lenta, e continuada, d'uma atmosphera inquinada d'emanções paludosas; porem estes effeitos podem ser attenuados pela boa natureza do terreno, pela agricultura, commercio, industria, que liberalisáo commodidades, e recursos capazes de neutralisar, e até mesmo aniquillar os seus perniciosos effeitos.

Sirva-nos d'exemplo as Indias Orientaes. Antilhas, e mesmo no nesso Paiz o Pará, e esta localidade, apesar de seu atraso, em que á seis annos estudamos euidadosamente a acção paludosa, e impugnamos os seus effeitos.

Fazemos votos para que o Governo lance as suas piedosas vistas para esta Comarca, e muitas outras da Provincia, animando o progresso da civilisação, consignando recursos, e promovendo medidas capazes de melhorar, e mesmo destrair os numerosos focos originarios de tanta insalubridade, e productores de tanta mortalidade, tendo em vista, que as forças, e prosperidades das Nações medem-se pela sua salubridade, isto é, pelo numero de braços

(a) *Traité de Med. legale.*

sãos, e vigorosos em estado de prestar trabalho, por tanto, para que qualquer Nação possa attingir tão caridoso e lucrativo fim, sera preciso, que o Governo tenha em toda a consideração o melhoramento, e conservação da vida de seus subditos: porém logo, que proceda em sentido inverso, esquece-se do berço, que lhe deo a vida, de seus irmãos, de quem Deos lhe concedeo a vigilância, e até de si proprio, tornando-se por este arte um máo governo, por isso, que o inferno não só está temporariamente inhabilitado para o trabalho, como até perturba e absorve o trabalho d'alguns outros, e o Cidadão que morre, deixa de ser útil á si, á sua familia, e a sociedade. Pelo que se vê, que o maior tributo que pode pezar sobre qualquer Povo, são as doenças: por tanto todo o cuidado e despesa applicados para as debellar, bem dirigidos, produzirão o lucro de mais de cento por cento para a Nação.

He esta ver ade apreciada desde a mais remota antiguidade, tanto assim, que os Governos de todos os tempos tiverão em, á maior consideração a saúde dos Povos, em relação a sua illustração. e até Legisladores houverão, que incorporarão regras d'hygiene á preceitos religiosos.

Não é só o homem que soffre a profunda acção dos pantanos, os seus effeitos são manifestos nos animaes, e vegetaes, que existem nesses lugares: assim Montfoucon diz, que os animaes de taes regiões são pequenos, magros, e dissaborosos: o que aqui observamos geralmente, tanto nos animaes silvestres, como nos domesticos: sirva-nos d'exemplo a Paca, o Boi, e o Porco, cujas carnes em verdade são pouco saborosas. Os fructos parecem ressentir-se de seus effeitos, como bem notou Hippocrates nos do Phaso, o que é mais ou menos bem pronunciado nos desta localidade. assim como, que as arvores geralmente d'enormes troncos, analisados vê-se, que a sua maior espessura é formada de camadas curtices, e alburno, ou branco: de muito pouco duramem, ou amago, suas raizes pequenas, raras, e pouco profundas.

Depois de termos visto os effeitos da acção lenta, e continuada dos pantanos, passamos á ver quaes são os effeitos de sua rapida, e energica acção, não só no homem, como nos animaes, e vegetaes: assim vemos ter lugar na epoca das vasantes, á estiolação, e mesmo á morte de muitos vegetaes; que existião proximos, ou immersos nesses lodações, o que parece ser dividido a esse quid, que nessa epoca dá lugar as febres aqui endemicas, operando então com mais energia: tanto assim, que nesse tempo é que apparece as Epizootias, isto é o mal, ou doença, que affecta um grande numero d'animaes, como se observa annualmente em maior, ou menor escala, nas galinhas, bois, cavallos, nos induzindo ainda mais a crer, que as doenças destes animaes são devidas as mesmas causas, que actuaõ no homem, não só pela persistencia d'affecções dos órgãos, que no homem são affectados com as febres paludosas, como por que teem lugar durante o tempo proprio dessas febres, por isso, que é subido, e temos observado as hypertrophias, ou grandes desenvolvimentos de fígado e baço e outras alterações mais profundas. depois da morte d'esses animaes causadas pelo mal: assim o fígado apresenta-se excessivamente entumecido, inflamado, amolecido, e de cor amarella esverdeinhada, a bils extravasada alterada, e como, que fermentada: o baço tambem hypertrophiado e de cor negra, os bofes epatisados, ou enfartados, e cheio de manchas enegradadas, a carne molle e alterada, a gordura com uma cor amarella suja, os intestinos tendo a mucosa interna mais ou menos manchada, e amolecida despegando-se a pressão. Diversos são os symptomas exteriores, assim umas vezes tristeza e somnolencie, olhos encovados, tremor convulsivo geral, e torturas, que os fa-

sêm girar muitas vezes a roda do mesmo lugar, o que indica affecção cerebral, ou grande dôr e anciedade, que os obriga muitas vezes á lançar-se por terra: e em muitos casos deitando-se a agoa fria sobre o dorço ou lombos, vê-se correr a agoa sanguinolenta: outras vezes apresentam-se desquartados, á ponto de não poderem andar, e á este apparatus symptomatico segue-se a morte em 24 horas, e as vezes em menos tempo.

Quanto aos homens temos, que as doenças n'elles produzidas pela actividade de sua acção, sãe inconstatavelmente as febres intermitentes, remittentes simples, ou perniciosas, as continuas acompanhadas quasi sempre de symptomas ataxicos, ou adynamicos, todas apresentam modificações, não só em quanto ao seu typo, mas mesmo emquanto á sua forma e intensidade, dependentes d'especies e circunstancias de localidade.

A sua existencia nos lugares pantanosos, sobre tudo na epoca de sua maior intensidade na razão directa da grandesa dos paues, e da energia, ou actividade de sua putrefacção, e emfim o seu infalivel desapparecimento, com a extincção dos pantanos, como attestão muitos observadores, e nós mesmo temos observado succeder annualmente nesta localidade, não nos deixão a menor duvida sobre a veracidade de similhante facto.

Quanto a intermittencia, ou continuidade, e sua maior gravidade, é como diz Clark "sempre em relação a energia, e intensidade da causa morbida."

As molestias consecutivas á estas febres são variaveis, porem as mais ordinárias são as obstrucções, e hydropesias.

Varios observadores de nomeada querem, que devão considerar-se affecções pantanosas, todas as que se possão rasoavelmente attribuir á mesma causa, seja qual for o seu typo, e forma: assim Boudin e outros, com razão querem, que a Peste, Cholera Indianna, a Febre amarella, sejão devidas á mesma causa, que Monfalcon, Chervin, e Humboldt, considerão como o extremo das affecções pantanosas, isto é, devidas á maior energia de sua acção, cujas molestias estão intimamente relacionadas á condições de lugares, e tempos, e que por isso não admira, que ellas appareção de preferencia em certos lugares, e determinados tempos: o que é devido á acharem-se sujeitas a essas e outras condições, assim vê-se, que a Peste e a Cholera, que occupa uma parte do antigo continente, posto que tenha invadido variaveis partes do globo, com tudo está á muitos seculos com constancia firmada nas regiões do Ganges; assim como a Febre amarella, ainda que variaveis vezes tenha ultrapassado seus limites reside e exerce principalmente seus destroços sobre o littoral do golfo do Mexico, nas regiões de Mississipi, e nas Antilhas.

Do mesmo modo, que estas doenças são apropriadas aos pantanos, outras ha, que apparecem accidentalmente, e outras cuja existencia é incompativel nos lugares onde ellas existem.

Que temos fallado do antagonismo, que Boudin e outros, disem existir entre as affecções putridas, a phthisica, e a febre typhoide: quanto á primeira, diz este author para corroborar a sua opinião: "que é rara nos lugares pantanosos e que nestes lugares em que erão descommuns, trem-se visto apparecer substituintes intermitentes, logo que se promove a destruição completa dos pantanos. opinião esta baseada em numerosas observações, e que concorda-se, em quanto á primeira parte em que se funda, com á nossa observação, por isso, que apenas temos sabido existir tres phthisicos durante seis annos de nossa residencia nesta localidade, em dous dos quaes se desenvolveo

esta affecção antes de virem habitar estas regiões, que parece ser d'utilidade a essa doença, porque em dous desses individuos, ambos já no segundo grão, conservou-se a molestia estacionaria por muito tempo: quanto a segunda affecção, não temos tido occasião d'observar, senão alguns symptomas, cumprindo as febres proprias desta localidade.

Alem das doenças febris, outras ha proprias dos lugares pantanosos, assim as do tubo intestinal, as diarrheas, dysenterias, scrophulas, scorbuto, certas affecções de pelle, sobre tudo a lepra, que Cailard (a) diz sahir perpetuamente com a peste dos antigos canaes do Egypto.

Alibert (b) tratando desta molestia diz, “que é tão funesta sobre os gelos do Norte, como debaixo dos calores ardentes da Zona torrida, onde a um extremo calor se une um ár humido, e carregado de meámas paludosos, e que abunda nos habitantes da Arabia, Egypto, America Meridional, e nas Ilhas de Java, Batavia etc., e que devasta o Reino de Sião, porque as terras são baixas, e quasi que submersas, a Ilha de Bourbon por abundar em lagos, agoas estagnadas etc”, o que realmente se coheste com o que temos observado nesta localidade, em que esta horriavel affecção abunda espantosamente. Diz mais o mesmo author, “que os alimentos de má natureza, muito podem cooperar para o seu desenvolvimento, figurando entre elles os peixes gordurosos, e viscosos, a carne de porco, e cita por exemplo os pobres do Japão: e Mr. Larrey diz, “ter observado effeitos funestos desta nutrição nos Francezes, que habitavão no Egypto, cujos effeitos forão mais, que ham apreciados pelos Hebrêos: tanto assim, que os seus legisladores prohibirão expressamente, o uzo da carne deste animal.

A vista do que expomos, parece muito provavel não só, que os measmas paludos, como a alimentação de peixes excessivamente gordurosos, concorão poderosamente para o desenvolvimento desta terrivel molestia nesta localidade, em que estas duas substancias formão a principal base da nutrição, por tanto temos que esta hedionda molestia, mil vezes mais terrivel, que todas aquellas, que claramente se attribuem ao effeito pantanoso, parece com razão s'attribuir á mesma cauza.

Seria d'utilidade, que as autoridades olhassem com attenção, e caridade para esses miseraveis degradados pelo seu repulsivo e nauseabundo aspecto, á ponto de serem o horror de si mesmo, e dos da sua especie, que os prescreve, e repelle, promovendo asylos, ou lasaretos em que livrando-os do trato geral, achassem os recursos precisos de subsistencia, e tratamento, podessem os Medicos ensaiar diferentes methodos de tratamento, alem dos muitos, que tem illudido os esperançosos esforços de milhares de distinctos praticos no tratamento desta tão temivel, como rebelde affecção. Explica-se, como dissemos, a diversidade das affecções paúlousas pelo grão de temperatura, que prezide a fermentação: assim, quanto maior fôr o grão de calor atmosferico, tanto mais, estas molestias serão rapidas na sua marcha, e mais constantemente mortaes, e revestidas de symptomas do systema nervoso, e outros apparelhos: em consequencia do que disem, que na Polonia é raro as febres intermitentes tomarem o typo remittente, e que nas Alagoas Pontinas são mais frequentes, e quasi sempre acompanhadas de symptomas ataxicos, e que na Africa, e America muitas vezes, e não poucas, revestidas da forma tetanica, cholérica, e al-

(a) Memoire sur les dangers des emanations marecageuses.

(b) Description des Maladies de la peau.

gila. Pelo que se vê, que a mesma affecção produzida pela mesma causa, se torna successivamente mais grave, e revestida de formas diversas á medida, que maior temperatura excita a causa producente: isto mesmo deve observar-se em toda a parte, qualquer que seja o clima, logo que tiver lugar uma maior elevação de temperatura atmospherica: assim temos observado as febres intermitentes e remittentes revestirem-se da forma perniciosa, e caracter epidemico neste territorio onde são geralmente benignes, logo que se dá esta condição.

A acção dos pantanos parece actuar sobre a economia, produzindo uma verdadeira intoxicação, da qual resulta molestias differentes, não só pela successão como pela natureza dos symptomas, entre os quaes as febres intermitentes e remittentes formão o primeiro anel da cadeia pathologica, que termina na cholera, peste, e febre amarella. Que estas molestias resultão da acção dos effluvios pantanosos é fora de duvida, mas qual é a natureza do principio, que as constitue, ou que oppera? E' o que ainda existe occulto por um véo misterioso, e que apesar dos esforços da sciencia, existe em perfeita ignorancia.

Muitas hypotheses, e theorias tem sido propostas, assim Varrão faz depender d'uma multidão d'insectos imperceptiveis, que creados, e desenvolvidos nos pantanos, são elevados pelo ar á se introduzir no nosso organismo para produzirem essas molestias.

Esta opinião abraçada por differentes sabios, entre os quaes figurão Lange, um dos mais celebres Medicos do seculo 17, Lancise no seculo 18, e mais modernamente Linéu, Vyrey, Raspail, e outros, que baseão a sua opinião no seguinte—em que todos os lugares, em que ha calor, e humidade sobre tudo em as agoas estagnadas ha um espantoso desenvolvimento de animalculos, que hão sido constantemente comprovados pelas observações microscopicas, dos quaes fazem depender a natureza, e intensidade das molestias palustres.

Assim dizem mais em favor desta opinião, que estas molestias não existem nas regiões Polares, em que o frio se oppõe ao desenvolvimento de taes animaes, tornando-se desta arte seus pantanos inertes, mas que a medida, que os climas vão sendo mais calidos, vão se desenvolvendo esses seres, que ganhando maior desenvolvimento, e tornando-se successivamente mais numerosos, vão produzindo molestias cada vez mais variadas e intensas, e apresentão mais em favor, que os remedios applicados em as febres intermittentes são geralmente amargos, e por esta propriedade, proprios para destruir os seres vivos.

Sylvio de Le Boe repellindo esta theoria suppõe depender de vapores salinos, e sulphurosos, que se desprendem desses lugares.

Ramazine abraçando esta doutrina diz, “que estes vapores produzem essas affecções coagulando o sangue. Lancise attribue a putrefacção de insectos. Brachet ás substancias vegetaes em putrefacção. Geannine e outros negão a existencia dos measmas, e attribuem ao calor. Raimond Faure attribue ao frio, e outros á variação de temperatura.”

Alguns ao desenvolvimento das plantas palustres, como Boudin, que diz, que provem as febres intermittentes na Bresse das emanções do *Antoxanthum odoratum*, e Humbold refere, que em algumas partes da America, attribuem ás emanções do *hippomane nancinilla*, e da *Mangifera indica*. Ramez faz depender da humidade atmospherica, finalmente na idade media forão attribuidas a conjunção de certos Astros, e hoje geralmente se suppõe

devidas á fermentação putrida de substancias vegetaes, e animaes. Não se fundando porem todas estas hypotheses em facto algum positivo, ou experiencias directas, forão regeitadas á excepção da opinião, que as faz originar da fermentação putrida, por ser a que apresenta um maior numero d'observações, e experiencias. Ulteriormente abalisados sabios como Thenard, Depuytren, Barthelet e outros, tratarão de analisar cuidadosamente o ar atmosphérico, para vêr se serão devidas á alteração proporcional deste fluido, e verificarem, que a composição normal do ar é um facto demonstrado por numerosas analyses, e experiencias.

Assim Juio Fontanelle em sessenta e tantas experiencias sobre o ar dos pantanos Cemiterios, Hospitais, Latrinas, Canos, e Estribarias, encontrou sempre o ar mais puro, e nas mesmas proporções. Gattin fez ver, que o ar dos pantanos de Fuentes era igual em pureza ao do elevado cume do monte Lignon: alem disto colheo o mesmo resultado no ar de pantanos diferentes, comparados com outras tantas montanhas. Em resultado ao que maistem chegado a Chimia é mostrar, que os gases, que se elevão dos pantanos, contem gaz hydrogenc carbonado differente do extrahido pelos processos ordinarios de mixtão com o azote, o qual passado pela agua deixa um residuo, ou materia animal oleosa, mui putrecivel, que em contacto com os corpos os faz entrar rapidamente em decomposição.

He ao que tem avanço da sciencia, ficando indecisas as outras questões, com quanto carecamos desses esclarecimentos, para devidamente avaliarmos o jogo d'affinidades provenientes da putrefacção, que dá lugar aos measmas, aguardaremos para o progresso da sciencia, limitando-nos por agora á confessar a nossa ignorancia a respeito da natureza intima desse quid, contentando-nos apenas com o conhecimento do seus effectos, que geralmente se supõem devidos á uma verdadeira intoxicação.

Quanto a propagação e influencia desse principio, as observações hão demonstrado, que a sua dilatação, ou condensação é sempre em relação as variações, ou vicissitudes atmosfericas, assim a sua acção é mais energica ao pôr do sol, á noute e especialmente de madrugada: a primeira circumstancia é devida ao maior calor do dia, que os dilata, espalha, e eleva-os na atmosphera, a segunda ao resfriamento maior da noute, que os condensa, e precipita para suas regiões inferiores. Os ventos concorrem para os espargir, e os conduzir á grandes distancias, pelo que se explica o desenvolvimento das affecções measmaticas em lugares não pantanosos, e o maior desenvolvimento destas affecções sempre em relação á força e violencia dos ventos: assim temos observado nesta localidade, que logo que apparece o vento sul, desenvolvem-se estas affecções, cuja intensidade é sempre em relação a força dos ventos.

A sua actividade no sentido orizental é na rasão directa da agitação do ar, ou na rasão inversa da distancia do foco, que Monfulcon avalia em 300 metros, porem esta avaliação é arbitraria, e mesmo falivel, porque a sciencia registra factos da apparição de seus effectos a maiores distancias, por isso, que causas poderosas podem influir na maior, ou menor actividade da propagação dos measmas.

A sua influencia, e actividade no sentido vertical fenece á grandes alturas da atmosphera, cujo termo não está determinado, com tudo, Suzza, que existe 300 metros á cima das Alagoas Pontinas, nunca manifestou as affecções paludosas, proprias deste ultimo lugar.

Monfalcon avalia em 500 metros, porem ha exemplos d'affecções paludosas, como a febre amarella e a peste, apparecendo em maiores elevações, e de que o cholera não respeita á altura, assim consta, que em 1822 grassava em Erzorom collocado 2128 metros á cima do nivel do mar, por tanto se vê, que o ar é o vehiculo do principio measmatico, cuja actividade será tanto maior, quanto mais baixos forem os lugares; e que assim sobrecarregado, não pode prestar o elemento preciso para uma boa sanguinificação, por acarretar principios, que se oppõem, retardam, e por ventura á inquinaem, ou a envenenem, ou já porque os individuos sujeitos á uma tal condição atmospherica se nutrem com vegetaes estiolados, e com annuaes, que vivem, ou vegetão debaixo das mesmas condições, o que fornecerá um chylo empestado, ainda mais em rasão da má acção, que ha em todos os lugares dessas regiões, resultando por consequencia má nutrição, e desta máo temperamento, e constituição, e pouca força ou energia para o exercicio de todas as funções, e d'aqui perturbações mais ou menos notaveis da economia. o que faz, que sejam geralmente de pequena estatura, e fracos, e muitos cachecticos, e extemporaneamente valetudinarios, inertes, e incapazes d'exercicios physicos, moraes, etc., o que os predispõe á contrahiras differentes affecções febris graves, que podem ser produzidas por alterações, ou modificações de sangue, por esse principio pantanoso, de que elle é vehiculo—resultando consecutivamente physcomias de figado, baço, e mesmo d'outras vicerias, principalmente abdominaes; tornando-se como causa d'outras doenças, que muitas vezes complicão com as febres; difficultando por esta arte o tratamento, ou protraíndo, e tornando inefficazes todos os recursos da arte: portanto temos, que o calor, esse agente tão preciso para a conservação da vida, alem da influencia directa, que tem sobre os seres vivos, que se achão submettidos à sua acção. é elle, que pelo seu excesso altera o ar ambiente, já modificando seus elementos componentes, já favorecendo a mixtão d'outros, que o degenera, já enfim alterando os alimentos e bebidas, tornando-se assim em principal causa predisponente da maior parte das affecções dos climas quentes.

Quanto a mortalidade nos lugares quentes e pantanosos é espantosa: segundo Pringle as affecções proprias destes lugares, comparativamente com as outras doenças são as que tem produzido mais mortalidade, pesando esta especialmente sobre os individuos não habituados á sua acção: segundo as observações de Villermé a infancia é mais sujeita a intoxicação measmatica, que Rochoux explica pela actividade da circulação, e por consequencia da aborção, o que realmente parece existir fora de duvida, pelo que geralmente temos observado, durante a nossa residencia nesta localidade, e é comprovado pelo livro d'obitos desta Freguesia, que tendo sido por nós consultado, verificamos, que a mortalidade das crianças era extraordinariamente superior a dos adultos, assim como na classe pobre, mais do que na abastada e rica. Finalmente quando a actividade pantanosa é fortemente activada, as suas affecções e morte não respeitão idades, condições, classe, ou circumstancia alguma.

Depois de termos succintamente esboçado a historia dos Paes, e mostrado a sua influencia sobre o physico e moral do homem, resta-nos indicar os meios geraes, que devem presidir á extincção desses focos d'insalubridade e morte, ou pelo menos de minorar os seus perniciosos effeitos.

A principal condição, que tem-se aprehender para deecceação de qualquer paúl consiste na mudança da direcção da corrente, ou correntes d'agoas,

que o entreteem, e dar facil escoamento as agoas mais inferiores, que existem estagnadas, por consequencia é preciso ter perfeito conhecimento da natureza das agoas, que os constituem, isto é, se provem immediatamente das chuvas, fontes, ou d'outras origens. porem qualquer que ella seja não se estagna toda, porque uma parte infiltra-se, a outra evapora-se lentamente na atmosphera; effeitos estes, como ja vimos, em relação a maior, ou menor permeabilidade do sólo, e a quantidade d'agoa elevada pela evaporação: o que pode variar em differentes localidades, e na mesma, segundo diversas circumstancias. Depois de bem conhecidas as suas causas produccentes, e bem estudadas, e examinadas as localidades, é que se deve pôr em pratica os meios adequados.

Suppostas estas condicções temos, que quando as correntes afluirem do exterior, devem ser desviadas por meio de vallas ou canaes, que as dirijão para sitios mais baixos, onde se não possam estagnar, devendo ser o numero e capacidade dessas vallas proporcional á grandesa dos pantanos.

O escoamento das agoas interiores se executará por meio d'um canal mediano, e na direcção mais favoravel a escoal-as, e se este não for sufficiente para receber os liquidos das partes lateraes, se escavarão secundarios communicantes ao principal. E' util que as valias sejam profundas, porque assim concorrerão para enxugar o terreno, que se terá o cuidado de conservar bem limpo, e prevenir que a vegetação as não obstruão, e inutilisem. Trollet considera os grandes canaes prejudiciaes, e proprios a se tornarem focos d'infectão, e propõe, que sejam substituidos por meio de pequenos canaes separados, seguindo ondulações favoraveis dos terrenos, e na direcção dos rios, onde devem terminar.

Tem-se aconselhado um outro meio para a extincção dos pantanos, o qual consiste em revestir os terrenos elevados e montanhas d'arvoredos que devem ser prolongados pelas encostas, até mesmo aos valls, do que resultão vantagens inculcaveis, por isso, que operando com vastissimo apparelho de condensação dos vapores atmosphericos, chamaõ sobre a terra agoas, que alimentando, e fertilisando as fontes, facilitaõ seu escoamento. tornando mais rapidas as correntes, e se oppoem ao desmoronamento dos terrenos, e a formação de torrentes urante o inverno, que deixando de serem entretidas no veraõ se estagnaõ: alem de que são obstaculos naturaes esses arvoredos aos ventos nocivos. Tambem se propõe para a destruição dos pantanos a introducção de correntes d'agoas exteriores, que augmentando a profundidade ponha em movimento as suas agoas. Quando os pantanos não são grandes, e não profundos, podem extinguir-se facilmente, enchendo d'entulho as depressões, ou alveolos, em que a agoa se estagna. Quando são devidos a inundação de rios, deve s'evitar, ou remover os obstaculos, que desviam, alterem, ou pervertão a corrente, e plantar arvoredos nas margens que obriguem o rio antes a escavar-se, do que a extravar suas agoas nas margens, e visinhanças.

Finalmente quando se não pode destruir um pantano variando as correntes que o alimentam, ou promovendo-se esvantes as suas agoas, deve se tornar mais profundo, o que se pode conseguir, ou pela elevação, e aproximação das margens, ou pela introducção de maior porção d'agoa, o que quando não concorda para promover a sua completa evasão, pelo menos attenne os effeitos de sua acção.

O trabalho de dessecação dos pantanos é perigoso aos obreiros, por

isso deve-se escolher a epocha do anno em que seus effeitos são nullo, pelo que deverão ser praticados durante o inverno.

A utilidade da extirpação dos pantanos é attestada por numerosos Paizes, que sendo out'ora o asylo da insalubridade e morte, se achão hoje salubres, florentes, e ricos; e se não diga-o a Cidade de Pisa, intitulada por Catullo — *capitulum pisaurum*—o que fôue depois do dosecamento dos pantanos que cercavão? Veneza, Hollanda etc., depois da transformação em prades cultivados os lugares out'ora murtos, e immersos; assim como as vizinhanças de Temeswar na Ungria, mais saudáveis com a extirpação dos pantanos. Lanchres, pões, e outros muitos lugares, e Cidades, em consequencia do que, e d'utilidade empregar todos os recursos, os quaes quando não possam destruir, ao menos possam corrigir, ou neutralisar a acção violenta, e mortifera dos pantanos, infelizmente tão abundantes no nosso Paiz, especialmente nesta localidade, por não fise mos vêr e em incutente paludosa, e que esses mercesos Pantanos, uns temporarios, outros permanentes, que os primeiros occupavão á extirpação, ou su' effeito de todos os campos durante o inverno, e que unindo-se com os permanentes formavão uma infinita estagnação, que desaparecia mais ou menos pelo verão, deixando ficar charcos, e lagos, constituindo os permanentes, a maior parte dos qures durante esta epocha, erão communicantes com o rio por meio d'igarapés, ou braços: assim como vimos quaes as causas, que concorrião para essa aluvião, que va desaparecendo logo, que com o verão cessão as copiosas chuvas, que a entrem; em vista do que, quaes serão os meios pelo qual poderemos prevenir essas enormes cheias, e aniquillar os numerosos pantanos? Sem pretendemos propor minuciosas regras d'Architectura Hydraulica, para o que seria preciso immensas fadigas, estudos e despesas, o que é incompativel com os meios ao nosso alcance, por isso nos limitaremos a apressurar unicamente as regras mais geraes, deixando semilante empresa para o governo, quando com mais attenção olhar para a hygiene, ou interesses e melhoramentos do Paiz.

O primeiro e um dos mais principaes meios é destruir, ou desfazer as voltas do rio Pinarê, que impedem o livre curso de suas correntes.

Segundo desobstru-o segregando de seu gremio os balzeiros, e outros obstaculos, que o obstruim. Terceiro plantando nas margens arvores, que impressão o estreitamento de suas margens, que pela sua accumulção torna mais razo e difficulta a corrente, o que s'observa em differentes partes do rio, sobre tudo na sua entrada. Quarto limpando, desobstruindo, alargando, e aprofundando os braços numerosos, que do rio são dirigidos para as baixas, charcos e lagos pelo que se vê, que sem ser preciso recorrer com urgencia a grandes obras hydraulicas pode farnos por este meio impedir as grandes enchentes, por isso, que nem o rio transbordaria para auxiliar a estagnação das agoas pela facil e enérgica velocidade de suas correntes, que com este trabalho adquiririão, e nem os lagos favorecerião a inundação dos campos pelas chuvas, por isso que achando facil sahida por esses braços, a medida que chovesse, as agoas meteoricas se irião escoando, entretendo-se por esta arte uma corrente mais ou menos permanente, não só durante o inverno, mais mesmo durante o verão. Quinto finalmente abrindo um largo canal ou furo, do lago de Vianna a partir do lugar Sucunapary em linha recta, que va terminar no Igarapé da Pinta—braço do rio Pindaré, cuja distancia pouco mais terá d'uma legua, ou então do Igarape Tamatuy, pequena ramificação do Maracú (braço do Pindaré) em linha recta a S, José, Fazenda do Brigadeiro

Lobo, que fica na margem deste rio, cuja extensão sendo um pouco maior do que a precedente, tem com tudo a vantagem de não invadir tanta terra de lavra, prevenindo-se assim a morosa inundação dos campos, que constituem os pantanos temporarios, e mesmo de muitos charcos, e lagos, que constituem os permanentes, diminuindo-se por tanto a insalubridade deste lugar: crescendo á estas vantagens, outras de grande valor, como seja a facilitação das viagens, por isso que nem as canoas ficarião demoradas no rio por cauza dos baixos, que durante o verão se formão no rio Pindaré, como porque achando durante o verão esta via de mais curta communicação, não seria preciso percorrer toda a extensão do rio até o lago, prevenindo-se por esta arte mais de quatro leguas de caminho, assim como se tornarião os campos mais proprios para a criação do gado, porque, prevenindo-se essas enormes cheias, não percerião em tanta quantidade, como acontece annualmente pelo inverno, e mesmo seria de grande proveito a lavoura, que poderia em grande parte ser passada para os campos, cujos terrenos são, como sabe-se, mais proprios para a agricultura.

Como porem não é facil pôr em pratica estas regras, será util, que cada um se cinja pelo menos á certas regras hygienicas apropriadas, para que se resguarde, ou atenuem os effeitos perniciosos dos measmas paludosos, dos quaes em resumo passamos a tratar.

REGRAS HYGIENICAS.

Os principaes preceitos hygienicos são em ingente parte consequencia do que referimos ácerca da historia dos Paues, nos quaes notamos que exercião duas acções, uma lenta e profunda, outra rapida e energica: a primeira exercendo-se nos individuos habitualmente subjeitos á sua influencia: a segunda, especialmente quando se desenvolvia maior energia das emnações paludosas por qualquer circumstancia, as quaes influão constantemente naquelles ainda não habituados, quaesquer que fosse o grão de sua energia.

A principal regra hygienica consiste primeiro em evitar os lugares, que encerrão agoas estagnadas, porem quando isto não possa ser, deve-se escolher a estação invernosa, em que as evoluções measmaticas desses lugares são menos perigosas. Segundo habitar o mais longe, que for possivel, dos pantanos, em lugares elevados, arenosos, e em habitações commodas, e bem construidas, das quaes as janellas se devem conservar abertas enquanto existir o sol no horizonte: acender lume no interior quando essas habitações forem humidas, habitar sempre os andares mais superiores. Terceiro, deve-se ter muito em vista as horas do dia em que a sua acção é mais prejudicial: assim deve-se evitar esses sitios na época do dessecação dos charcos, campos e lagos, principalmente as tardes e noites, e quando no verão apparecerem chuvas pouco abundantes, por isso que, é sabido, que nessas epochas a sua acção é perigosa, assim como a qualquer hora, especialmente nas que fião indicadas. Quarto, deve-se evitar a impressão dos ventos, que sopram dos pantanos essencialmente quando se sentirem suados. Quinto, o corpo deve-se conservar constantemente preservado da humidade, o que se pode obter pelos vestuarios d'algodão, ou lã; nunca se conservará os vestidos principalmente de linho molhados, sobre tudo em repouso, assim como as extremidades inferiores serão resguardadas da humidade. Sexto, os alimentos devem ser de boa qualidade, e facil digestão, assim convem á alimentação

tónica, sem ser excitante, como carne de vacca, boa farinha, ou pão, e a mistura dos alimentos animaes e vegetaes, e a mais appropriada nutrição e sobriedade, dizem ser um grande meio preservativo. Septimo, deve-se evitar de beber agoas estagnadas, e quando pela falta d'agoas correntes houver extrema necessidade, deve-se mistura-la com um pouco de vinho ou agoardente, ou inda melhor ferve-las, e filtra-las em carvão e as guardar em vasos de barro bem arcjadas. O chá, e o café são uteis de manhã cedo, a noute antes de se expôr ao ar livre, sobre tudo pela madrugada, os licores alcoholicos e fermentados são uteis tomados em moderada quantidade. Oitavo, o abuso dos praseres venerys, e os excessos de todo o genero, predispõem a contrair affecções measmaticas. Nono, o trabalho não se deve começar antes de sahir o sol, e deve-se terminar antes de recolher-se, nunca se deve dormir exposto a acção pantanosa, porque alem das vecissitudes atmosphericas acrece a maior actividade dos pantanos durante a noute. Taes são resumidamente os conselhos, ou preceitos indicados aos habitantes de taes lugares, porem como apesar do uzo, ou pratica destas indicações, muitas veses os effeitos da absorção measmatica se manifestão, por isso passamos a descrever as differentes affecções, que dellas podem provir, principiando pelas febres, porem antes de fallarmos de cada uma dellas em particular, faremos algumas considerações geraes.

TERCEIRA PARTE.

FEBRILES.

DENOMINAÇÃO ESTRANGEIRA. (*)

Os Gregos a denominavam—pyrexia: os Latinos—Febris: os Italianos—Febbre: os Hespanhoes—Fiebre, Calentura: os Inglezes—Fever: os Alemães Fieber: os Hollandeses, Koorts: os Suecos, Feber, etc.

ETYMOLOGIA.

A palavra febre é derivada por alguns de ferver, ferver, porque se suppunha, que na febre os humores entravão em movimento á maneira dos liquidos em ebulição: outros a derivão de februare, purgar, purificar, porque muitos Medicos a encaravão como uma opperação salutar da natureza: os Gregos d'um vocabulo, que designa fogo, para exprimir o calor, que é um dos effeitos mais constantes de estado febril.

A palavra febre applicada aos grupos dos symptomas variaveis por suas causas, numero, intensidade relativa ou absoluta, duração, e terminação, é um termo abstracto, assim como —a febre em geral, e as diversas ordens de febres em particular, são seres de convenção criados para commodidade das classificações, pelo que se vê, que é difficil dar uma boa definição de febre, ponto sobre o qual os Medicos de diferentes idades teem constantemente desaccordado, por tanto sem nos demorarmos em as diversas opiniões emitidas sobre este objecto, diremos, que febre como geralmente se entende, é um estado pathologico, ou morbido, caracterisado pelo augmento de calor da pelle, acceleração da circulação, alterações de sensibilidade, e perturbações d'algunhas, ou de todas as funcções, apresentando-se constante, ou periodicamente, quasi sempre como principal phenomeno.

O augmento de calor, que Hippocrates e os antigos encaravão como o phenomeno caracteristico da febre, é um dos mais constantes, sem que todavia seja um indicio certo do estado febril. O calor é variavel, do qual os doentes ordinariamente teem consciencia, e os Medicos a percepção, porem nem sempre ha uma exacta relação entre a sua intensidade, e a sensação experimentada pelos doentes, assim muitas vezes os doentes accusão intenso frio, e o calor da pelle se acha excessivamente elevado: outras veses denuncião o sentimento d'ardente calor, e a pelle apresenta-se ligeiramente quente, e algumas vezes fria, como já temos tido occasião de observar: outras vezes se manifesta com vivacidade n'alguns pontos do corpo, posto que o resto da pelle se conserve no estado natural: pode ser fugaz, ou continuo, pequeno, crescer, diminuir, cessar, e reapparecer por intervalos regulares, ou irregulares: algumas vezes elle é primitivo, porem outras consecutivo ao frio: por tanto temos, que o calor é muito variavel, e que muitas vezes não passa d'uma sensação percebida pelos Medicos.

A acceleração do pulso, que Boerhaave, e outros considerão como caracter constitutivo, é realmente um dos phenomenos importantes da febre, mas só

(a) Comp. de Medicine pratique par M. Lonis de la Berge, et M. Ed. Monneret.

por si não pode ser tido como um signal febril, attendendo-se, que a acceleração do pulso é constante e manifesta em certas condições do organismo, como depois da ingestão, convalescencia de molestias graves, carreiras, e certas impressões moraes, como iras, sustos, alegrias, etc.

O grão de frequencia do pulso pode variar muito, as mais das vezes apenas ha acrescimo de algumas pulsações, outras o dobro, triplo, quadruplo, e mesmo mais, á ponto de que pela sua frequencia torna-se difficil, e mesmo impossivel o seu conto.

Todos os individuos, alem dos phenomenos indicados, experimentão ou tras perturbações funcionaes, que sem serem constantes e caracteristicas, todavia devem ser mencionadas, taes são, o estado de moleza, ou prostração fadiga, dores contusas nos membros, cephalalgia, ou peso de cabeça, diminuição ou abolição d'appetite, sêde, respiração frequente, e modificações d'algumas seccções.

A febre, como elemento de diagnostico, não fornece por si só dado algum, isto é, não prova se não, que existe um estado morboso, por tanto para tirar um verdadeiro valor semiotico, é preciso ter em vista algumas circumstancias accessoriaes, como intensidade, marcha, typo, duração, e lezões organicas, que a acompanhão, ou complicaão.

Ainda que a febre não seja sempre um synonymo d'inflamação, como se tem pretendido, entretanto deve-se sempre investigar se alguma lesão occulta existe, procedendo-se assim, se reconhecerá na maioria dos cazos, que a febre é um reflexo dessa lesão, em alguns cazos porein o estado febril por si só constitue a doença, porque por indagações as mais minuciosas não se verifica alteraão local primitiva, ou pelo menos é só a febre o elemento apreciavel para nós.

E' sabida a intima relação, que existe entre o systema vascular sanguinio e o nervoso, do que resulta, que um delles não pôde ser affectado sem que o outro seja igualmente.

Sabemos, que nem sempre a perturbação d'uma funcção é indicio d'alteraão material de tecido do órgão, ou órgãos, que a executa: assim vemos, que uma emoção viva accelera a circulação, que um excesso de cholera perturba as funcções intellectuaes, e leva a desordem a toda enervação, e nem por isso se supporá, que o cerebro, ou nervos, o coração ou vasos sejam lesados na sua textura: quer exista ou não lesão organica, observa-se sempre no estado febril uma exaltação mais ou menos notavel das propriedades vitaes, e mudanças sensiveis, que se opperão então na economia, e que parecem ser o producto d'uma reacção exercida debaixo da influencia do systema nervoso.

No primeiro caso temos, que se um órgão, ou apparelho se achar affectado ou lesado, essa lesão não ficará limitada a elle, parece se estender á todos os órgãos e apparelhos, tornando-se assim geral, por isso, que conspiratio una, consentientia omnia: porque, a causa estimulante põe em acção os vasos, e as mais delicadas partes elementares. e irritaveis dos órgãos affectados, exercendo uns sobre outros a sua acção sympathica, tornando-se assim a perturbação geral, estabelecendo-se por esta arte a febre symptomatica.

Sem duvida uma cauza puramente local pôde dar lugar a symptomas geraes, assim vemos muitas veses phlegmasias agudas produsir a febre, e que uma plectora, ou uma irritação local são seguidas de plectora, e irritação geral, o que prova, que o estado febril não é sempre primitivo, perem nestes

casos o órgão lesado deve apresentar os symptomas característicos do seu soffrimento, antes da manifestação da febre, por isso que parece-nos absurdo, que qualquer que seja a sua importância, e função, experimente em seus tecidos alterações graves, sem que a sensibilidade e irritabilidade, que lhe são proprias, sejam modificadas, e exaltadas a ponto de exercer sobre os principaes centros nervosos uma influencia capaz de sympathicamente produzir uma affecção geral, antes que esse órgão manifeste os signaes característicos de sua alteração.

No segundo caso vimos, que um trabalho morbido, desconhecido em sua natureza intima pode dar lugar ao mesmo phenomeno, por tanto temos, que differentes causas operando sobre a economia podem dar lugar a lesões locais, capazes de produzir o estado febril, que neste caso torna-se elemento, ou symptoma da lesão ou lesões materiaes do órgão ou órgãos affectados, como se observa na maioria dos casos, e que em outros actuando sobre toda a economia produz o estado febril com a ausencia de toda a affecção local, forma só a doença, e constitue os symptomas primitivos, e predominantes, estabelecendo-se assim a febre essencial, primitiva, ou idiopathica. Por tanto observando-se a coincidência dos symptomas, com a natureza presumivel ou conhecida das causas morbosas, não se pode pôr em duvida a sua existencia.

A febre como elemento de prognostico é sem perigo, quando a uma curta duração não se liga alguma lesão grave dos solidos, ou liquidos: prolongando-se, pôe-se tornar grave, ou mortal por provocar alterações mais ou menos profundas de muitas viceras, cujas lesões serão proporcionaes a intensidade e duração do movimento febril. Com quanto não se possa estabelecer regra absoluta á este respeito, diremos, que no prognostico se deve ter em vista a condição, idade, constituição etc. do individuo affectado, assim como a causa que a produz, seu typo, e forma etc: por tanto temos, que a febre continua é mais grave, que a intermittente, e que esta será mais grave quanto mais se approximar das remittentes, e continuas. As chronicas gravissimas, por se ligar, tem quasi sempre a lesões organicas, antigas, e profundas.

Quanto as suas causas são variaveis. Sem nos demorarmos nas differentes theorias propostas sobre este objecto diremos, que essas causas são em grande escala desconhecidas, em umas se acha rasão sufficiente do movimento febril em uma phlegmasia, uma exaggeração funcional d'algum órgão, ou alguma alteração de sangue, que pode ter lugar sem inflamação appreciavel, depois d'uma simples modificação da vitalidade dos tecidos, por causas formadas e desenvolvidas em nós mesmos: assim por affecções diversas do fígado, e baço, e dos órgãos digestivos, e por supprêssões bruscas de secreções habituaes, ou accidentaes, ou por causas exteriores, que podem alterar o ar, já por excesso, já por defeitos de principios capazes d'o alterar, á ponto de que indo actuar directamente sobre o sangue nos pulmões, e sobre a pelle, dê lugar a degenerencia sanguinea, capas de as produzir. Muitas outras teorias são indicadas, no entretanto ignora-se a maneira, porque muitas dellas obrão, a explicação do seu mechanismo não satisfaz ao espirito, ou é de demonstração difficil, ou impossivel.

Quanto ao seu tratamento temos, que a sua therapeutica será dirigida em relação a natureza da febre, e a predominancia de tal, ou tal symptoma, assim os ante-phlogisticos, evacuanes, revulsivos, topicos, excitantes, defusivos, anti-spasmodicos etc., podem ser aconselhados muitas vezes, e elles obrando directamente sobre a molestia principal, ou sobre o systema circulatorio, podem

modular a febre, por tanto só seus caracteres proprios, ou phisionomia, e natureza podem determinar a escolha do remedio.

Sendo a febre sempre um mal, qualquer que seja a sua forma ou natureza, deve-se acelerar a cura, apesar da opiniao dos Medicos antigos, que apoiados na authoridade de Boerhaave, que aconselhava deixar durar um certo tempo as febres intermitentes logo, que não compromettão a vida do doente, e não as curar senão ao septimo dia, e de Sydenham sobre a pretendida utilidade da expectação sobre as febres continuas, deixando-as durar em quanto não houvesse perigo para o doente, perdendo por esta forma muitas vezes a época, em que facilmente se poderia imprimir uma feliz direcção á doença e obter sua cura.

Não sendo o nosso fim fasermos um tractado de Perythologia, mas simplesmente descrevermos as differentes affecções dos Paizes quentes, e pantanosos, por isso sem nos cingirmos a classificação alguma, as iremos apresentando de forma, que se torne mais facil a prehencher o nosso fim. Principiando pelas febres trataremos em primeiro lugar das febres intermitentes.

FEBRES INTERMITTENTES EM GERAL.

Synonymia. Febre de accesso, dos pantanos, periodica, vulgarmente as susões, maleitas.

DEFINIÇÃO.

Esta febre é conhecida desde ilados as mais remotas, tanto que foi mencionada por Hippocrates em muitos dos seus tractados.

Ella foi methodicamente descripta, primeiro por Celso, depois por Galeno, e outros escriptores Arabes. Do seculo 16 e 17 para cá, esta affecção foi estudada cuidadosamente por numerosos authores, e hoje acha-se bem descripta em muitos tractados de Perythologia, Pathologia interna, em numerosas Dissertações, e Monographias etc.

Da-se o nome de febre intermitente a uma affecção febril cujos symptomas cessão, e se reproduzem em intervalos mais ou menos aproximados, iguaes, e regulares, ou pouco iguaes e irregulares, o que constitue os accessos separados por uma remissão completa ou apyrexia.

Esta febre em alguns casos não é precedida de prodromos, ou phenomenos precursores, porem em muitos manifestão-se previamente á sua invasão certos accomodos, como cephalalgia, anciedade, hiccôjos, espreguiçamento, palidez, tendencia ao sono, etc., phenomenos estes seguidos logo do primeiro accesso.

Os seus differentes symptomas constituem o accesso, cada um dos quaes se divide em tres tempos chamados estados, ou periodos, distinctos pela sua ordem numerica, isto é, em primeiro, segundo, terceiro estado, ou ainda melhor pela denominação de periodo, ou estado de frio, de calor e de suor: o primeiro periodo é devido a contração dos capilares arteriaes da periphéria do corpo, que dá lugar a concentraçao da torrente circulatoria, e é caracterisado mais e mais evidentemente por frio geral, e de duração variavel: durante elle notam-se pello palida, franzida, ou enrugada, pulso pequeno, irregular, e frequente; o segundo devido a contração dos grossos vasos, que compem o sangue a circular nos capilares periphéricos, tornando-se então o calor externo, a pelle rubra, o pulso cheio, lento, e frequente; o terceiro é assignalado

por sudores copiosos, dependente dos vasos arteriaes, que são os órgãos secretores do suor, o qual diminua a temperatura, e abate successivamente as pulsações até se caracterisar a remissão. Estes phenomenos se succedem nos casos regulares na ordem indicada. O periodo de tempo, que separa os accessos, chama-se *apyrexia*, ou *intermissão*: nos dias que separam os accessos chamão-se *intercalares*, e os dias durante os quaes reapparecem, *paroxysmaticos*.

Typo, a ordem segundo a qual os accessos volião, se correspondem, e se encadeão: assim admittem-se muitas especies de tipo, porem os principaes são o *quotidiano*, *terçan*, e *quartan*.

No primeiro, os accessos tem lugar todos os dias, e são similhantes pela sua duração, violencia, e os principaes symptomas, que o acompanhão. No segundo, os accessos se renovão todos os dias, deixando um *intercalar*. No terceiro, os accessos se renovão todos os tres dias, e são separados por dous dias de *apyrexia*.

Estes tipos offererem variedades, que importão conhecer, assim chama-se *doble quotidiana* a febre que apresenta dous accessos por dia: *doble terçan*, quando apresenta um accesso todos os dias, porem com a notavel singularidade de que os accessos dos dias pares 2.º e 4.º se correspondem por sua intensidade, e duração, existindo igual correlação nos recessos dos dias impares: *doble quartan*, quando apresenta um accesso dous dias seguidos, seguindo-se um dia de *apyrexia*, porem os accessos se encadeão de maneira, que o accesso do quarto dia é similhante ao do primeiro, e o do quinto ao do segundo, assim como a *apyrexia* do sexto corresponde a do terceiro. São estas variedades as mais communs na pratica, alem destas os autores admittem muitas outras variedades, ou tipos, assim a *terçan dobrada*, a *quartan dobrada*, a *quartan triplicada*: na primeira, ha todos os dous dias, dous accessos em 24 horas: na segunda, dous accessos em um dia, seguidos de dous dias de *apyrexia*: na terceira, ha tres accessos, no primeiro, septimo, e decimo dias, e a *apyrexia* nos dias *intercalares*. Tambem se tem fallado das febres *triple terçan*: o *triple quartan*: na primeira, ha dous accessos, no primeiro e terceiro dias, e um só no segundo e quarto, correspondendo-se os accessos de dous em dous dias: na segunda, ha um accesso todos os dias, os quaes se correspondem todos os tres dias, isto é, o primeiro similhante ao quarto, o segundo ao quinto, e o terceiro ao sexto.

Enfim tem-se admittido a *quintana*, *sextana*, *septana*, *ocana*, *noneana*, *mensal* etc., porem todas estas variedades são rarissimas na pratica.

ETIOLOGIA.

Ha poucos lugares em que se não observão as febres intermitentes, ao menos no estado esporadico, entre tanto diz-se, que esta molestia é desconhecida nas Indias Orientaes, no Cabo da Boa Esperança, na Islandia, em certas partes da Russia, e Suecia, tanto assim, que Caillard (a) diz, que Linêo para provar, que são pouco conhecidas, em certas Provincias deste ultimo Paiz, conta que um homem tendo vindo de Holin a H-raesand, doente de febre intermitente, todos os estudantes encararão como uma coisa espantosa ver um homem ter frio em pleno estio.

(a) Memoire sur les dangers des emanations maracageuses, et sur la maladie epidemique observée a Pantin.

As causas das febres intermitentes esporádicas são, segundo muitos autheores, variadas nos lugares em que ellas não reião epidemicamente, assim tem considerado como causa desta affecção tudo, que pode impressionar o systema nervoso, assim pode ser suscitada por uma impressão moral viva como medo, ira, desvios de regimen, variações de temperatura, todo o genero de excessos etc.

Esta affecção reima d'uma maneira endemica na vizinhança dos pantanos e ribeiros, e em todos os lugares em que ha estagnação d'agoas, em sólo pouco permittivel, em cujos lugares não é raro muitas vezes assumir a forma epidemica. Numerosas são as causas producentes desta affecção nestes lugares, que dividiremos em predisponentes, e determinantes, na primeira classe temos as impressões moraes vivas, a intemperança, os excessos venereos, e todos os que podem concorrer para extenuar o organismo: as cazas mal construidas, e nas proximidades das margens, ensaiadas, dos rios, lagos e charcos, a má alimentação, a pouca nutrição, a agoa de má natureza etc., o que é bem apreciavel neste territorio, em que a maior parte das casas são mal edificadas e de palha, e collocadas entre, ou na proximidade de pantanos, e em que os peixes, que vivem no seio desses pantanos, formão a base essencial da nutrição: assim como a farinha, muitas vezes mal preparada, e os frutos mal sasonados, a agoa de poços, rios e lagos, como bem fizemos ver na nossa Memoria sobre a febre amarella, publicada em 1853, e as bebidas alcoolicas de que uma grande parte faz um immoderado uso.

Na segunda classe temos as emanções naturaes de certas plantas, que não passa d'uma aserção intundamentada, o calor, que alguns authores considerão como causa desta ordem, que em quanto a nós oppera activando a putrefacção, e volatilisação desse elemento toxico, elevado dos pantanos: a humidade atmospherica, que se influe, é favorecendo a fermentação, e putrefacção dos detritos organicos, de animaes e vegetaes, existentes nos Paues, tambem apresentão nesta ordem os terrenos baixos e humidos, as ruas immundas, o surrimento de mattas em sólo virgem, o que é plausivel logo, que coincida o concurso de circumstancias capazes de produzir como nos pantanos as evoluções measmaticas: alguns authores considerão o frio como um agente, ou causa capaz de as produzir, porem se elle alguma influencia tem, é em condensar e precipitar os measmas, que nestas condições podem occasionar maior absorpção desse agente toxico, cuja actividade varia segundo o clima, topographia, estado calmoso, de agitação, hygrometria, e grão de calor do ar atmospherico etc. A mistura da agoa doce com a salgada, é com razão considerada como uma das causas mais poderosas da energia dos measmas na produção destas febres.

A sua esphera d'actividade é extraordinaria nos Paizes quentes, tanto, que Monfalcon diz, que nas Indias, Navios afastados 1500 tocas do fóco da infecção forão theatros de seus funestos effeitos.

Esta emigração d'effluvios explica a apparição das intermitentes em lugares altos, secos, salubres, e longinquos do fóco.

A sua incubação tem uma duração variavel, pode ser d'um dia, muitas semanas: porem a mais ordinaria é ao septimo dia, o que dá razão da manifestação desta febre alguns dias depois da separação do fóco infeccionante.

Lind, Lancise dizem, que o habito embota e torna os individuos costumeiros, ou oriundos desses lugares, refractarios á sua acção, como bem observamos durante a epidemia da febre amarella, que contra a nossa expectativa

vimos ser benigna, quando tinhamos sobejas razões para esperarmos o contrario, a vista das convergentes condições por excellencia nocivas desta localidade.

SYMPTOMAS

Como dissemos, esta febre pôde não ser precedida de prodromos, ou ser: em qualquer dos casos a febre principia pelo estado do frio, que varia muito, n'alguns doentes pôde-se apresentar uma sensação de frio parcial, ou geral, e ephemero, porem o que se observa mais geralmente é que o frio é intenso, e acompanhado d'uma sorte de tremor da pelle com a elevação dos bulbos, algumas vezes pode ser tal, que determine o tremor convulsivo dos membros, e dos dentes, porem em geral o frio não adquire esta intensidade se não lenta e successivamente: a principio é limitado a certas partes, isto é, as extremidades, rosto, ou lombos, para depois se radiar por toda a superficie do corpo, ou se circunscreve a um ponto, como se observa nos accessos pouco intensos, ou nas febres anômalas.

Desde o principio do frio observa-se os effeitos de sua acção nos órgãos mais afastados do centro circulatorio, assim o nariz, as orelhas, os dedos das mãos e pés, tornão-se frios e palidos, ou descorados. se o frio é intenso, a face torna-se de côr plumbosa, a pelle semeada de placas coradas, os olhos encoados, as pupillas dilatadas, a cabeça inclinada, e os membros em flexão e approximados do tronco, a voz alterada, cansada e tremula, ao que correspondê dores contusas nos membros, nas cadeiras e lombos, aperto, ou dôr no epygastro e na região splênica, palpação, e muita anxiedade, quasi constantemente acompanhada de vomitos: neste primeiro estado a pelle é secca, o pulso frequente e deprimido, sêde viva, urinas aquosas, e pouco abundantes: este periodo tem de duração uma hora pouco mais ou menos, e pode variar d'um quarto d'hora, á cinco e mais: a sua intensidade nem sempre tem relação com a gravidade do accesso, finalmente este estado pode fallhar, como já por vezes temos observado. O segundo periodo substitue ao primeiro, e o calor, que caracteriza este, começa por apparecer nas extremidades, d'onde se vae irradiando progressivamente, até tornar-se geral: a sua intensidade é variavel desde a ligeira sensação do calor, até a d'um ardor queimante: durante este segundo estado persiste a cephalalgia, a sêde, e anxiedade, a oppressão diminue ou cessa, o pulso torna-se amplo, a urina carregada ou rônxa, mais rara e quente, a face se ingêta, e a pelle se humedece: a duração deste estado varia entre uma, e dose horas, e pode se prolongar até vinte quatro, e mesmo mais. O terceiro estado caracterizado pelo suor, substitue ao calor: principia por mostrar-se na cabeça e peito, d'onde se espalha até se tornar geral, pode ser ligeiro, ou abundantissimo, e logo que se estabelece desaparece a cephalalgia, dôres, sêde, o pulso perde a sua frequência, as urinas tornão-se mais abundantes e menos quentes, e menos carregadas, a duração deste pode variar, tanto quanto os precedentes, a remissão, ou apyrexia subsequente ao accesso, é raras vezes acompanhada de saúde perfeita assim ordinariamente os doentes ficão abatidos, palidos, sem forças e sem appetite, as digestões são penosas, ha cephalalgia etc., phenomenes que são dependentes do typo, e tem po de retorno dos accessos, que as vezes tem lugar a horas fixas, outras vezes se adiantão, ou se retardão da hora, e alguns são tão curtos, que o segundo começa antes que o primeiro tenha cessado inteiramente, neste caso a febre chama-se sub-íntermitte.

VARIEDADES.

Alguns autores pretendem, que nas febres quotidianas o accesso tem lugar de manhã, que nas tercans das dez ao meio dia, e nas quartans das tres as cinco da tarde, porem Mr. Majillot diz, que a este respeito se não pôde estabelecer regra fixa, o que combina perfeitamente com a nossa observação: por isso que por innumeras vezes temos verificado a fallibilidade de semelhante pretensão. O que realmente concorda com o que temos lido, e observado, é que as febres quotidianas são mais frequentes, que as tercans, e estas mais que as quartans, assim como, que é fora de duvida, e com alicutosa afiançamos, é que o typo da febre, e sua intensidade, é sempre na razão directa da concorrencia de circumstancias, que põem em acção o principio measmatico. Muitas vezes temos visto variarem de typo, isto é, as quotidianas mudarem-se em tercans, ou vice versa, os accessos s'approximarem á ponto de tornarem-se remittentes, e mesmo continuos, ou ao contrario, se afastarem successivamente, e assim vão perdendo a sua intensidade até desaparecerem.

COMPLICAÇÕES.

Algumas vezes ellas se complicão do estado inflammatorio, belioso, mucoso, ataxico, adynamico, porem de todas estas complicações as mais communs a este territorio são as beliosas, depois as mucosas, e em seguida as inflammatorias, raras vezes temos visto complicar-se do estado ataxico, e adynamico, algumas vezes temos observado em pessoas fracas e nervosas, e quasi sempre em seguida as complicações mucosas, e sobre tudo beliosas.

O estado belioso se aggrava durante o accesso, temos visto persistir algumas vezes na apyrexia, e que é sempre acompanhada de grande abatimento, assim como que sem debelar essa complicação, é inefficaz o sulphato de quiniño: o seu maior concurso é em fins do inverno, ou principio do verão.

O estado mucoso acomette mais facilmente pessoas debeis, e a sua frequencia é em relação a humidade atmospherica, e são mais communs no principio do inverno.

Na complicação inflammatoria o frio é quasi sempre intenso e curto, o calor ardente e prolongado, e acompanhado de signaes de congestão cerebral e pulmonar, e com tendencia a passar ao typo subcontinuo, ou remittente, acomette geralmente as pessoas ainda jovens, fortes, e sanguinias, e são mais constantes durante o verão.

DURAÇÃO.

As febres intermittentes tem uma duração variavel, segundo a observação d'alguns autores, porem temos reparado, que as quotidianas em geral são mais curtas, que as tercans, e mais refractarias a qualquer tratamento durante o verão, do que durante o inverno.

Temos visto os accessos reproduzirem-se durante meses, e muitos observadores attestão ter visto reproduzir-se mais tarde.

ACCIDENTES CONSECUTIVOS.

N'algumas pessoas temos visto no fim de dous ou tres accessos a pelle to-

mar uma côr amarella particular e caracteristica, boia manifestar-se no rosto, e que parece devido ao empobrecimento do sangue, que Bretonneau diz resultar, ou antes succeder a estas febres. O ingorgitamento do baço, algumas vezes consideravel á ponto de descer até o nível do umbigo, ou a crista iliaca esquerda, acompanha, ou succede aos diferentes typos intermitentes, principalmente as tercans, e quartans.

Temos visto algumas vezes grandes ingorgitamentos de baço, e ligeira de figado, associada a côr amarella caracteristica de que fallamos, sem que tenha sido seguida, ou acompanhada de fôbre, o que supponmos ser devido a acção lenta e continuada dos meismos pantmosos. A' cephalalgia, que muitas vezes persiste durante a convalescença, sobre tudo das febres complicadas do estado inflammatorio. Emfim as diferentes hydropesias: porem communmente s'apresenta apenas o edema nas pernas, ou pés sómente, e ligeiramente na face, porem algumas vezes é geral, quasi sempre acompanhado de ascite.

RECAHIDAS.

E' esta doença uma das mais sujeitas a recahidas, os alimentos indigestos, os purgativos, a exposição ao frio, a humidade, as insolações, os desgostos, ou ira, os prureros venericos, finalmente todos os excessos, são causas estas as mais ordinarias das recahidas, que tanto mais temiveis serão, quanto mais graves tiverem sido as febres: segundo alguns escriptores, nas recahidas se deve reproduzir o typo, o que algumas vezes temos visto fallhar.

SIGNAES DE RECAHIDAS.

O signal para prognosticar a recahida nestas febres é um problema, que muito tem preocupado á diversos authores. Bonardem diz, que éminente todas as vezes que o doente conservar uma estria vermelha na margem das gengivas: Paoli diz ser quando a lingua se conserva mais larga, mais grossa, e mais lenta nos seus movimentos.

Vanoye (a) diz, que observa-se nos individuos affectados destas febres, revirando-se a palpebra inferior, e volvendo-se o globo ocular para cima, um espaço muito patido, de forma semilunar, cujas pontas deão voltadas cada uma para o angulo ocular correspondente, a margem concava correspondendo a parte inferior da sclerotica, e a convexa desenhando-se sobre a mucosa, que reveste a face interna das palpebras: a palidez deste espaço, (diz elle) que é na razão directa do gráo em que o organismo foi affectado, e que quando este signal persiste depois de desaparecimento dos accessos, é indicio certo de recahida, porem notamos, que tanto este, como os outros signaes indicados, são falliveis não poucas vezes, com tudo não sirva isto d'estorvo, a que milhores, e mais attentos observadores que nós resolvão este problema, com o que a pratica colherá não pequena utilidade.

DIAGNOSTICO,

O Diagnostico da febre intermitente regular é facil e simples, attende-

do-se a successão dos tres estados, verdade é que algumas vezes pode talhar alguns delles, ou se confundirem, porem ainda assim não é difficil, empregando-se attenta observação, até mesmo nas crianças, por isso que se não podendo interrogar succede, que o frio passe desapercibido. e o suor muitas vezes seja pouco abundante, ou mesmo falhe, servindo sobre tudo para esclarecer o diagnostico a exploração do baço, cuja intumescencia é apreciavel a principio, e durante alguns accessos.

PROGNOSTICO:

As febres intermittentes sporadicas são mais facilmente curáveis, e menos sujeitas a recahidas, que as endemicas e epidemicas: as febres quotidianas são menos rebeldes que as terçans, e estas que as quartans: a infancia, a velhice, as constituições debéis, as affecções chronicas dos órgãos digestivos são condições, que augmentão a gravidade do prognostico, enfim são sempre más por causa dos phenomenos consecutivos á que ellas dão lugar, e que quasi sempre desaparecem com lentidão.

TRATAMENTO.

Sendo esta doença uma das mais geralmente frequentes especialmente no nosso Paiz, e sendo a historia da Medicina emula do tempo, que nos reflecte—as diversas applicações das variadas e multiplicadas substancias, que os Povos e praticos de todas as idades até a nossa tem ensaiado e recomendado, por isso antes de apresentarmos o methodo, que nos parece mais util segundo o nosso modo de vêr. referiremos a historia da variada therapeutica indicada, e preconizada por illustres praticos, que a porfia tem enriquecido a sciencia com as soas infatigaveis observações: assim Barthez (a) e outros, dizem ter obtido excellentes effeitos da camphora associada ao nitro, no tratamento destas febres, quando complicadas de symptomas ataxicos. Barton, a gomme kino associada a gencianna, ou calumba. Bœumlein, a herva, ou extracto da scutellaria galericulata nas terçans, sobre tudo nas pessoas de digestão fraca. Berandi, prefere o citracto de quinino ao sulphato, porque diz não provoca a cephalalgia e zunidos nos ouvidos como este. Bergius diz ter se servido com vantagem da assafetida nos casos rebeldes.

Bernedi administrava o elebro, de preferencia a quina, em altas dozes nas quartans.

Bidot parece que foi o primeiro, que annunciou a folha da Oliveira como um dos melhores succedaneos da quina.

Biermann cita com successo a raiz da aristolochia redonda.

Bodin diz ter empregado o azevinho com vantagem por espaço de 30 annos.

Bertini affirma a sua efficacia.

Breier elogia o subnitrato de bismuthe, dado na dose de um grão, a grão e meio na apyrexia.

Brera as flores de Zinco.

Broussais filho, os banhos d'agou fria.

(a) Dictionnaire abrégé de therapeutique par sad. A. Szerlecki de Varsovie.

Brutti o hydrocyanato de quinino.

Buchaave a raiz da boa noite como succedaneo da casca peruviana.

Buchwald prefere o carbonato de ferro a quina, sobre tudo nas quartanæ.

Cagnon diz ser util febrifugo a lépidina, substancia extrahida do lépidium-iberis.

Calvert diz ter applicado com vantagem o carvão.

Carrie indica para os casos rebeldes o sulphato associado ao extracto de quina.

Casper a inoculação da vaccina para estes cazos.

Ceriole o hydro-ferro-cymato de quinino de dous a oito grãos por dia.

Chevalley, e Rivaz a lupinina extrahida do tremço cuja simples decoção é usada com vantagem pelo povo de Napoles.

Collin diz ter empregado a arnica montana com vantagem em uma epidemia destas febres, as quacs se convertião em adynamicas, logo que as combatia pelas preparações de quina, cuja efficacia é affirmada por Meza, e Consbruch.

Coste e Willemet consideraõ o verbascum lychnitis, como especifico das quartanæ.

Cruveilhier o fruto do lilás.

Davidson o ether sulphurico misturado com agoa d'hortelan-pimenta.

Desbois o ether associado a quina.

Dulton Baker e Meh/hausen a cravagem de centeio.

Fanchier os pós de James.

Faust a terna d'aranhas.

Facinus a chinchonina em vez da quina, quando esta não pode ser suportada.

Fournier, e Vaidy a raiz da valerianna officinalis em pô, na dose de uma a tres oitavas na apyrexia.

Fowler a solução d'arceniato de potassa na dose de tres até vinte gottas tres veses por dia, cujos effectos são gabados por Arnold, Freer, Jackson, Slevoat e outros, e que Walker diz ser util associado ao quinino.

J. S. Frank o alumen n'agoa de camomilla, o que tambem foi usado por Festler, e Rosenthal, associada a nos-moscada.

L. Frank os calomelanos na dose de 4 a 10 grãos nos casos d'inefficia do sulphato de quinino, e o mercurio doce só, ou associado a quina por Bailloy, por Baillies Willis e outros.

Gassaud banhos quentes

Giannini affusões frias.

Gillespie as seguintes pilulas: camphora 2 grãos, opio 1 grão, calumelanos 5 grãos, para formar 4 pilulas, das quacs dava uma antes do frio.

Graf o sulphato de soda.

Guerin nos cazos de complicações bronchicas o extracto de lactuca ordinaria, o de meimendo associado ao acetato de morfina.

Hahnemann a fava de Santo Ignacio, quando os accessos erão acompanhados de dyspinéa e tosse.

Harless o phosphato de quinino ligeiramente acido, de preferencia a quina e sulphato de quinino.

Hartmann a cascarrilha associada a quina.

Heincken a cola forte nas febres intermitentes irregulares, e rebeldes

Hildenbrand a casca da tulipeira—*leriadendrum tosiifera*.

Hosack prefere ao sâes de quina a seguinte mistura, d'uma caça de quina, duas de suino de limão, e seis d'agon, para tomar uma colher todas as horas na apyrexia.

Huteland apresenta observações de curas pelo phosphoro.

Hellberg com vantagem diz ter empregado nas reacchidas, a infusão forte d'hortelan pimenta, calamo aromatico, e casca de laranja.

Hellie diz, que a applicação do torniquete no braço direito e coxa esquerda suspende o estado de frio, e Chlodni affirma a efficacidade da ligadura circular do braço, logo depois da cessação do estado do frio: assim como Bourgehe confirma a efficacia do ligadura dos membros.

Klose diz ter com successo empregado nas quartans os pedi-luvios com quina.

Kounineck empregava a phloridzina vantajosamente na dose de 10 a 15 grãos

Kiister a ratania.

Lange a agoa de funcho com canella, na dose de meia oitava todas as duas horas.

Linde um vomitorio antes do accesso, e tintura d'opio durante o estado do calor.

Lobstein pilulas de sulphato de quinino com extracto d'alcaçuss.

Loiseleur Deslongchants as flores de narcisa.

Luchtmann dava a quina associada ao tartaro stibiado.

Ludovici empregava a genciana, misturada com uma pequena quantidade de nos-vomica, de preferencia a quina, que Wedel empregava só nas terçans.

Mackintosh usava sangria durante o estado do frio.

Maisano empregava o caroço do fruto do prunus armeniaca (Damasco) como succedaneo da quina.

Marc o sulphato de ferro na dose de 17 grãos por dia.

Marinelli pretende ter obtido alguns cazos de cura pela applicação da raiz fresca do ranunculus-repens, sobre a parte externa da região epigastrica.

Martin filho o sulphato de quinino pelo methodo endermico.

Mead a camomilla.

Melli a piperina.

Miquel, Andral, Blaincourt e outros a salicina.

Munaret o chloroformo de sodio, que na sua opinião é tão efficaz como a quina, e seus oimpostos.

Nepple a centaura menor, que depois da quina considera como o melhor febrifugo.

Oxly aconselha associar o pyretro á quina.

Paldanus diz ter curado uma febre intermitente rebelde, com café cru em pó na dose de 15 graos, misturado com 5 de pós aromaticos, de duas em duas horas.

Peysson a sua bem conhecida poção, que elle considera d'effeito superior a quina.

Pointe ministrava o sulphato de quinino em fricções nas gengivas, e mucosa dos labios, na dose de 4 a 8 grãos.

Piil a cubeba em pó, na dose de oitava e meia.

Rightelli o sal amargo,

Ronandez diz ter curado as rebeldes, pelo tanato de quinine e chinchona.

Root empregava a narcotina.

Salomon diz ter curado as febres as mais rebeldes por meio de repetidos vomitórios, mesmo nos casos da não existencia de symptomas indicando saburra gastrica.

Schvilgue diz ter applicado algumas vezes com vantagem o benjoin, nas terçãs.

Seguin pretende ter curado 41 pessoas com claras d'ovos.

Sertuani, que descobrio a chinoidina, a considera mais efficaz, que os outros alcaloides, na dose de 2 a 3 grãos por dia.

Spielmann empregava o hydro-chlorato, na dose de 1, 2 ou 3 grãos.

Stammler agua de loureiro-seirja.

Thedem empregava os evacuates e fundentes, e em seguida as folhas de belladonna em pó.

Thilow o crystalino dos olhos do boi.

Thomson a infusão de quassia.

Valemin considera de vantagem superior a quina, o olio volatil obtido pelas distillações das folhas e ramos da melaleuca leucodendro.

Wheaton o phosphato de ferro.

Wichmann a ipecacuanha na dose de 1 grão todas as 3 horas.

Willans, Heyne, Reydellet e outros, a rasca da angustura.

Zotlikoffert affirma os bons effeitos do hydro-cyanato de ferro precedido d'um purgante, ou vomitorio.

Mais recentemente o Doutor Chevreuse Medico dos indigentes da Charmes-Sur-Moselle (a), propoz como util succedaneo da quina o sumo das folhas da tanchagem: porem Mr. Perret tinha feito á longo tempo uma communicação a Accademia das Sciencias de Lausanne, sobre a raiz desta planta: o primeiro, empregava não somente o plantago-majior, e o plantago-minor, e o lanciolata, em quanto, que o segundo empregava exclusivamente o majior: assim nós vemos, que é difficil encontrar uma affecção, contra a qual se tenham ensaiado mais meios therapeuticos, e que não obstante existirem poderosos, todavia muitos praticos infatigaveis, e zelosos da sciencia não cessão d'investigar meios outros, que por ventura com mais vantagem possam servir de succedanios a esses já conhecidos. Porem de todos os meios que mencionamos, apenas temos podido apreciar o valor therapeutico d'alguns durante a nossa curta clinica, assim a vaccina proposta por Casper, observamos casualmente pela primeira vez em uma preta, que padecia de febres intermitentes, até ahi rebelde a todo tratamento, desaparecer dias depois da inoculação da vaccina, o que nos excitou a ensaiar em outros, sem que podessemos colher o mesmo resultado, pelo que parece-nos não ter o valor, que este author lhe quer dar, todavia será bom que outros praticos experimentem, e assim auxiliem as observações, que continuamos a fazer á semelhante respeito. A decoção de café cru em pó, aconselhada por Paldanus, temos ministrado á alguns doentes sem vantagem, o que incontestavelmente temos obtido em variados casos com a salicina aconselhada por Miguel, com a poção de Peysson, e com o arcenico por Fowler, Slevoat, Arnold, Freer e outros, parecendo-nos com razão serem estes agentes os mais valentes suc-

danios da guaina e seus preparadouros, que sem duvida alguma, é o específico por excellencia das febres intermitentes, e nós passamos a mostrar descrevendo os methodos por nós usado.

Alguns Medicos da antiguidade apoiados na authority de Galeno, e Boerhaave, que consideravão estas febres como um esforço salutar da natureza, aconselhavão o methodo expectante, combatido por Torti, Lind, Werthof, firmados nas mais que bem fundadas razões, de que as repetições dos accessos, podem dar lugar a graves lesões do organismo, e até mesmo mudar bruscamente o caracter benigno em peccioso, por cujo motivo, seguimos esta pratica, applicando em primeiro lugar os meios appropriados durante o accesso, e em segundo os capazes de prevenir o seu retorno, como aconselha Wilson-Phillips: assim durante o paroxismo procuramos terminar o estado presente, e sonhar o que lhe deve succeder, por tanto durante o estado do frio procuramos favorecer o desenvolvimento do calor, e durante este, excitamos o estabelecimento do suor: para preencher á primeira indicação mandamos cobrir o doente com cubertores d'algodão, ou lã, tendo-lhe previamente mandado applicar pedilúvios quentes com cinza, mostarda, e pimentas, ou então sinapismos nos pulsos, dorso, ou planta dos pés, e tomar infusões aromaticas quentes de casca de laranja, chá da India, da terra, de contra-hera, flores cordões, herba-cidreira, e outras substancias da mesma natureza: durante o calor continuamos com estas mesmas bebidas ligeiramente aciduladas, a que mandamos renhir algumas gotas de landano, sobre tudo se ha secura, vomitos, ou disposição para isso, assim como nestes casos usamos da mistura sativa, cosimentos emolientes combinados com substancias acidas, em pequenas dozes para não provocar vomitos, porem se apesar destes meios, este estado se estende, á ponto de tornar moroso o apparecimento do suor, mandamos dar clysteres purgativos, e fortemente apimentados, o que no maior numero dos casos promove abundante suor, e com o que temos colhido muitas vezes grande proveito quando administrado no periodo do frio, por excitar immediatamente o calor e suor.

Durante a apyrexia empregamos os meios indirectos, com o fim de combater os accidentes, que possão contra-indicar o emprego dos meios directos, ou febrifugos, com o fim d'impedir o retorno dos accessos.

Quanto aos primeiros, são os principaes as sangrias geraes, e locais, e os emeticos: o primeiro costumamos ministrar ordinariamente durante o estado do calor, se o sujeito é forte e sanguinio, se o calor febril é intenso e prolongado, e se existem signaes de viva congestão visceral: algumas vezes temos visto a sangria interromper os accessos, e cortar a febre: quanto as loções feitas com ventosas, ou sanguiugas sobre o fígado e baço, quando ingurgitados, ou então no anus: o que é seguido de fomentações contra-estimulantes sobre esses órgãos, e bebidas emulsiões, ou temperantes. O segundo meio é um dos que mais usamos, porque quasi sempre concorre complicação febril, ordinariamente prescrevemos na apyrexia, e na epoca mais afastada dos accessos.

Os purgativos, sò quando depois dos vomitivos existe forte constipação de ventre, e refractaria, á fútes clysteres deste genero, então só usamos dos amargos tão como rhubarbo, são de magnesia etc.

Quanto as segundos, temos em primeiro lugar o sulphato de quinine, que é o melhor e mais seguro febrifugo que temos mais constantemente empregado, e com o qual indubitavelmente temos colhido mais vantagens no trata-

mento desta doença. A dose que empregamos, sua forma, e administração são variaveis segundo a idade, e outras circumstancias: assim, aos adultos no caso de não haver contra-indicação, applicamo-lo internamente em pô, em pilulas, ou em soluções na dose de 18 a 20 grãos, em 2 ou 3 doses, mediante o intervallo d'uma hora entre cada dose: se em pô, usamos da seguinte formula.

Sulphato de quinino.....	dezoito grãos.
Valeriana silvestre.....	} â a seis grãos.
Canphora.....	

Para misturar, e dividir em tres papeis iguaes, que mandamos tomar diluido cada papel em uma chicara d'infusão d'herva-cydreira associando 6 ou 8 gottas de laudano, ou então involvido em assucar, em obreia, em banana assada, ou misturada com café.

Se em pilulas, a seguinte formula (a mais usada.)

Sulphato de quinino.....	dezoito grãos.
Lactucario, ou opio.....	} â a oito grãos.
Canphora.....	

Para formar tres pilulas iguaes, e toma-las com o intervallo dito, e sobre cada uma alguma bebida aromatica ou temperante, na dose dita.

Se em solução, a mesma dose de sulphato de quinino em limonada sulphurica, uma libra adoçada com charope de morfina, ou associada com algumas gottas de laudano. Nas quotidianas esta dose é sufficiente para as cortar, na maioria dos casos, porem nas terçans, e quartans é quasi constantemente preciso repetir por dous dias, ou mais as doses, ou então uma dose dividida para dous dias, e assim divididas continuamos a dar por mais alguns dias: preferimos a applicação deste medicamento por uma só vez, e em alta dose como aconselha Torti, e não em pequenas e successivas durante muitos dias como aconselha Talbot: primeiro, por ser o methodo deste mais falivel, moroso, e mais caro, por isso que dando-se esta substancia em porções fraccionadas, muitas vezes apesar das reiteradas doses, tem o inconveniente de não terminar a febre. e será sem consideração, ou de pouca importancia accelerar a cura destas febre? Parece que não, porque é sabido que as perniciosas nem sempre se manifestão com character assustador, e que algumas vezes escondem a sua má indole debaixo do simulado véo de intermittentes simples, quando menos é sabido, que a repetição dos accessos podem occasionar graves lesões viceraes, e mesmo deteriorar todo o organismo: e é preciso este, já a seculos aconselhado por Hyppocrates de cortar immediatamente a febre intermitente de origem pantanosa, principalmente nos Paizes quentes. Segundo, porque alem das razões expostas, as repetidas e fraccionadas doses de quinino tornão-se d'effeito nullo, porque a economia habituando-se á ellas se embôta, ou torna-se insensivel á sua acção e tem o inconveniente de originar gastralgias muitas vezes rebeldes. Terceiro enfim, porque este methodo cura com maior porção de sulphato de quinino, o que torna o curativo mais dispendioso, como bem prova o senhor Doutor Simas (a): por consequencia parece que não merecem contestação as razões, que temos para preferir o methodo de Torti ao de Talbot, animando-nos a seguir esta pratica o conhecimento do exagerado receio das propriedades irritantes desta substancia

(a) Jornal das Sciencias Medicas de Lisboa. Tomo 10, fallando a respeito do tratamento das febres intermittentes pantanosas.

em alta dose, tão temida por muitos praticos, por isso, que desde o anno de 1851 para cá, em que adoptamos esta forma de tratamento, não temos visto se seguir ao seu emprego gastralgias, ou outro incommodo qualquer, e por consequencia parece-nos sem inconveniente a sua applicação pela forma mencionada.

Tambem costumamos applicar este medicamento em clysteres, feitos com cosimento emoliente, com algumas gotas de laudano, algumas veses para auxiliar a sua applicação interna, porem mais especialmente nos casos de contra-indicação a sua ingestão: algumas veses temos empregado pelo methodo endermico, com o que temos colhido bons resultados, o que praticamos despojando a pelle de sua epiderma por meio d'um pequeno visicatorio, e applicando sobre a superficie denudada de 3 a 4 grãos, 3 veses por dia, porem tem este meio o inconveniente de produzir viva dôr, que muitas veses se prolonga, a qual sendo excessiva, diminuímos a dose do medicamento, que reunimos a altêa, ou gomma-arabia em pó, com o que depois mandamos pulverisar a parte visicada, que quasi sempre sára com extrema lentidão: tambem temos empregado dissolvido n'agua, ou alcool fraco, na dose de 6 a 12 graos em fricções sobre o epigastro, columna vertebral, nas axilas, face interna dos braços, coxas, e algumas veses mesmo nas gengivas, e mucosa labial, em muitos casos temos tirado vantagem, sobre tudo nas recentes idades, porem na nossa opinião é de todos os methodos de applicação o mais falivel. Nas crianças de 6, 8, a 12 grãos conforme a idade e caracter febril, encorporado em charope laudanizado, em leite, café etc., e quando pela idade se recusão á tomal-o, applicamos como aconselha o Doutor Rul-Ogez, D'Anvers (a), em suppositorio feito com um escropulo de manteiga de cacáo, 6 grãos de sulphato de quinino, e duas gotas de laud. liq. d'Syd.

Muitas veses temos visto apesar de todo este tratamento frequentes recahidas, ou mesmo rebeldia, não só á este como aos outros methodos de tratamento, que passamos a descrever, e então temos visto, ou sabido cederem a qualquer impressão moral forte, ou qualquer desejo extravagante, e a mudança d'ares, ou á ausencia do lugar infeccionante.

Como dissemos temos tirado incontestaveis vantagens da bebida stibiada de Peysson, e sua ponnada, no tratamento desta affecção, principalmente quando complicada de symptomas beliosos, e nas recahidas, depois do, tratamento pelo sulphato de quinino, pelo que se torna recommendavel a attenção de todos os praticos.

Principiamos por tratar os accessos pela forma que indicamos e durante a apyrexia passamos a dar esta bebida como se segue: uma colher de sopa na primeira hora, duas na segunda, tres na terceira, augmentando-as progressivamente em cada hora, deixando o intervalo de quatro horas na administração do medicamento, para tomar caldos, e depois continuar a tomar o remedio no sentido inverso do que tinha tomado nas primeiras horas, isto é, decrescendo successivamente até chegar á uma colher, auxiliando este tratamento com fricções de pomada stibiada de duas em duas horas na parte interna dos braços, peito, ventre, dorço, coxas, variando mais ou menos de lugar, para prevenir que se formem pustulas: n'alguns casos temos conseguido abortar completamente os accessos, e quando isto se não dê, temos observado,

(a) Jornal das Sciencias Medicas, Tomo 2.º pagina 236. Trad. do senhor J. P. G. Carneiro.

que quando se reproduzem são mais fracos, de sorte que na maioria dos casos desaparecem com a insistencia desta medicação, por uma ou mais vezes nas seguintes apyrexias, assim como em muitos casos as intumescencias do baço, fígado, e ictericia, desenvolvidas durante, ou em seguida aos accessos, desaparecerem com este tratamento.

Nas recentes ilades é sufficiente para prevenir os accessos, a instante applicação da pomada em fricções.

Quanto as preparações arcenicas, sobre tudo o acido arcenioso, os arceniatos de potassa e sôda, são d'utilidade no tratamento destas febres, como provão as observações de Fowler, Freer, Brera, Fodéré, Dofur, e Boudin Medico do Hospital de Versailles, que diz ter curado 2947 doentes de febres intermitentes de todos os typos, e em sexos e idades differentes, com acido arcenioso, sem que uma unica vez occorresse o menor accidente toxico, tão temido, e que tem dado lugar a opposição da parte de muitos Medicos.

Sem que deixemos de reconhecer os justos fundamentos desses receitos, todavia parece-nos não serem sufficientes, para se equilibrarem á vantajada utilidade deste medicamento, por isso não só pela inexpugnável energia de sua efficacia no tratamento desta, e outras affecções, como pela sua baratesa, e sobre tudo porque outras substancias toxicas são usadas em Medicina com vantagem, e geral assenso.

Com tudo apesar destes receitos, d'a muito tem sido usado por differentes praticos, e desde 1812 que tem sido mais ou menos ensaiado pelos Medicos Portugueses, tanto, que o Doutor Agosunho Albano da Silveira Pinto affirmar ser de vantagem no tratamento destas febres o licor arcenical (a) de Fowler (a): e mais recentemente por outros distinctos praticos, em suas clinicas particulares, e no Hospital de S. José, e S. Lazaro, sem inconveniente, e com proveito em differentes affecções, sobre tudo nas febres intermitentes.

A formula mais usada por esses illustrados facultativos, é a de Boudin, composta com acido arcenioso, 1 grão dissolvido em agua destillada—16 onças, para tomar uma colher de sopa de duas em duas horas na apyrexia, como se pode ver pelo artigo sobre o emprego das preparações arcenicas inserto no Jornal das Sciencias Medicas de Lisboa, tomo 10, que nos animou a ensaiar esse agente desde 1853 para cá, e podemos affiançar termos colhido os melhores resultados de seu emprego em 303 pessoas, em quem temos applicado sem que se tenha dado inconveniente, que nos obrigasse a recorrer ao sequioxido de ferro ou a magnesia, e temos o cuidado de recommendar aos doentes a suspensão do remedio logo que appareça ligeiras dores epygasticas, nauseas, ou disposição para isso, cujos symptomas apenas tiverão lugar em duas mulheres fracas e nervosas, que forão suspensas com infusão de casca de laranja laudanizada, e adoçada com charope d'ether.

Taes são os meios de que nos temos servido durante cinco annos no tratamento de 2594 doentes, accomettidos de febres intermitentes, por nós tratados durante este lapso de tempo, dos quaes 212 com a bebida de Peysson, 303 pelo arcenico, 2179 pelo sulphato de quinino, em rasão do que parecemos poder tirar as seguintes conclusões: primeiro, que o sulphato de quinino é incontestavelmente um heroico febrilugo, segundo que é mais prompto, menos prejudicial, e mais economico, quando applicado em alta dose, terceiro, que é ordinariamente falivel o seu effeito, quando não precedido d'emetico.

(a) Cod. Pharmaceutico pelo mesmo author, Edo. de 1841.

quarto, que a bebida de Peysson é util e vantajosa no tratamento das febres intermitentes, sobre tudo nos casos de inefficiencia do sulphato de quinino, de compunção beliosa ou outra contra-indicação, e que sô por si pode concorrer para desvanecer o ingorgitamento das víceras abdominaes, quinto, que é incontestavel a acção febrífuga do acido arsenioso, sobre tudo quando precedido de vomitorio. sexto, que na maioria dos cazos o acido arsenioso é perfeitamente tolerado, quando prescripto pela forma e dose á cima indicada.

ACCIDENTES CONSECUTIVOS.

A cephalalgia, que muitas vezes persiste depois da cura dos accessos, temos visto ceder á sangrias geraes, bixas no anus, e á purgativos amargos, sobre tudo se á essa se liga abatimento geral, inapetencia, ou anorexia.

O ingorgitamento do baço, e figado quasi sempre concomitante, ou consecutivo as febres intermitentes, se é pequeno cede facilmente á sangrias geraes e locaes, na maioria de vezes só á esta associada aos banhos mornos, as fricções de pomada mercurial dobrada, só, ou reunida ao alcali volatil, a de hydrídato de putassa, e outras, cataplasmas emollientes, e os brandos laxantes: quando consideravel temos visto passar o rebordo das costellas, e descer obliquamente pelo hypochondrio esquerdo, até a ponta corresponder a parte superior e lateral da região umbelical, e as vezes até chegar a parte superior e anterior da espilha iliaca, neste caso pela compressão, que elle exerce nos órgãos visinhos, pode dar lugar a certos accidentes taes como a dyspneia, cansasso, tosse, vomitos etc.: e não poucas vezes dá lugar á derramamentos asciticos, e ælemas, ou infiltração cerosa dos membros inferiores e todo corpo, consequencia da difficuldade, ou obstaculo que a circulação venosa experimenta: neste estado é quasi constantemente acompanhado d'accessos febris regularmente intermitentes, ou mesmo remittentes, e então administramos o sulphato de quinino como na febre periodica ordinaria, sangrias geraes e locaes, fomentações desobstruentes, como por exemplo as fundentes de Vicq d'Azir, as de Blaud, o extracto de ferro duas oitavas para duas libras d'agua, para se dar as colheres, os dioreticos, especialmente á silla, digitalis, colchico, e os drasticos.

Como dissemos a hypertrophia do baço podia dar lugar, ou era causa de hydropesias, em consequencia do obstaculo á circulação venosa, produzido pelo desenvolvimento insolito d'esse órgão, combinado com a alteração profunda do sangue que dá lugar á essas colleções cerosas tão communs, concomitantes, ou consecutivas as febres intermitentes, taes como o edema dos membros inferiores, que é caracterizada pela inxação, e palidez da pelle parcial, e sem dôr, nem mesmo quando se comprime com o dedo, deixando ficar uma depressão, que desaparece passado algum tempo: desaparece a medida que cede a obstrução da víceras: em alguns casos, esta inxação é indicio d'uma hydropesia insipiente, se de todo corpo anasarca, cujos caracteres varião: em geral a pelle é palida, ou branca, leitosa, a pressão não produz dôr, mais deixa uma depressão, que mais tarde desaparece lentamente, outras vezes os tegmentos apresentam uma dureza, e resistencia extraordinaria, especialmente na infiltração é tanto maior, quanto mais laxo é o tecido celular, assim as palpebras podem ser infiltradas de forma a cobrir completamente o globo ocular, o scroto, e prepucio no homem, os grandes labios na mulher, podem adquirir volumes consideraveis: enfim a cerosidade obedecendo as leis do peso se acu-

mulão em grande copia nas partes mais decliveis, taes como cadeiras, e membros inferiores. Quando a pelle se acha assim destendida, a sua temperatura torna-se menor a medianna, perde a sua humidade, sua flexibilidade, e sensibilidade diminuem, essa destenção pode chegar a um extremo tal, que se fenda, e de passagem a cerosidade, assim como tem uma grande tendencia para gangrena, que muitas veses é causada da morte, e nós temos observado em alguns doentes a mais ligeira picadura produzir gangrena, precedida d'inflamação erysipelatosa, que se termina pela morte: estado este acompanhado quasi que constantemente de languidez da maior parte, ou de todas as funcções da economia, a sede é mais ou menos viva, e a diarrhea que muitas veses concorre, ou apparece no ultimo periodo, faz augmentar a fraqueza, as urinas raras etc., Ascite, ou accumulção de cerosidade na cavidade peritoneal logo que se dá, o ventre augmenta pouco a pouco de volume, e vae se deformando á ponto de que se o doente está á pé, ou assentado, o hypogastro e regiões ilíacas formão uma saliencia mais ou menos consideravel, se deitado horizontalmente de costas, o ventre se achata no centro, e os flancos se alargão, se deitado sobre um dos lados a elevação se forma no ponto mais declive. Á medida, que o derramamento augmenta, o ventre torna-se mais tenso e de volume extraordinario, neste estado não é raro as vezes formar-se um tumor molle, fluctuante e transparente, que augmenta por qualquer esforço devido á distenção, e elevação da cicatriz umbelical.

A percussão deixa sentir um som macio tanto mais pronunciado, quanto maior for o derramamento, e mais intenso no hypogastro, e para os flancos: e vae diminuindo para a parte superior, e a medida que se vae aproximando do umbigo, vae tornando-se mais elastico e sonôro, de sorte, que ácima deste ponto, o som torna-se tympanico, devido aos intestinos em rasão dos gases que contem sobre-nadarem ao derramamento, á fluctuação, que se sente facilmente pela sucção, ou applicando-se a mão d'um lado do ventre, e tocar ligeiramente com a outra do lado opposto, a então sente-se a sensação d'um choque, ou d'uma undulação, que é mais manifesta no hypogastro e flancos.

Quando a Ascite se torna consideravel, a pelle do ventre torna-se tensa e lisa, e o tecido celular subjacente se infiltra de cerosidade, que pouco á pouco vae ganhando o resto do corpo. As víceras abdominaes, os órgãos digestivos sobre tudo experimentão então perturbações funcçionaes em relação ao grão do derramamento: assim as digestões tornão-se laboriosas e difficeis, as vezes ha vomitos e uma constricção de ventre, rebelde, muitas veses o tubo intestinal sobre tudo o estomago, são a sede d'uma exalação gazôza abundante, que augmenta e torna a ansiedade mais penivel, assim cotro mais se aggrava com a ingestão d'alimentos e bebidas: a sede é viva, as urinas são raras, o que parece ser devido a compressão exercida sobre os rins, e ureteres. Ha dyspinêa, tosse, palpações que affligem aos doentes, que p rece poder-se explicar pela elevação do diafragma, que recalçado pelo liquido no sentido vertical diminue a capacidade da cavidade toracica, e por consequencia dá lugar a compressão dos órgãos nella contidos, e aos phenomenos ditos.

O edema dos membros interiores, e o desenvolvimento insolito, que muitas veses tôma as veias subcutanias abdominaes, e mesmo a das paredes lateraes do peito, parece em grande parte devido a compressão das veias abdominaes tanto, que depois da paracentese ve-se desaparecer o edema, e essas veias retomarem o seu calibre.

As pessoas asceticas tem a face palida e emagrecida, e todo o habito exterior é alterado, a pelle quente, hálitueza, o pulso alterado.

TRATAMENTO.

A primeira indicação a preencher é combater a causa mais remota, assim o caso vertente devemos em primeiro lugar combater a febre, que entretem a obstrução de baço, o que podemos conseguir, e em seguida ella mesmo, pela forma indicada no tratamento da hypertrophia do baço: muitas vezes é sufficiente preencher esta primeira indicação, para se operar a cura: porem, quando não seja possível, devemos tentar a evacuação da cerosidade, em primeiro lugar pelos meios indirectos, tâes como os purgativos, os vomitivos, os diureticos, os sudorificos, os sialagógos, os visicatorios, com o fim de provocar as secreções, e activar a absorção do liquido infiltrado, ou derramado, ajudando este tratamento interno com banhos aromaticos quentes, fricções excitantes, como por exemplo d'agua de colonia, linimento volatil, tinturas e pomadas dioréticas, em ultimo caso recorreremos aos meios directos, tâes como a incisão, ou á purção, e em quanto ao regimen alimentar e bebidas variamos conforme as condições particulares dos doentes.

FEBRES INTERMITTENTES PERNICIOSAS.

Da-se este nome as febres intermittentes, que pela sua gravidade e sua rapida marcha podem terminar pela morte durante o curso d'um accesso: esta febre mais rara, que as intermittentes simples, é mais, ou menos frequente em o nosso Paiz, nesta localidade sem duvida alguma. onde faz não poucos estragos: já era mais ou menos conhecida pelos antigos, tanto que Hippocrates, Praxagoras, e os Arabes tinham visto algumas febres intermittentes se acompanharem d'accidentes mortacs, porem parece, que o caracter destas febres foi completamente desconhecido até o seculo 17, em que apparecerão escriptos de Mercator, e em que Morton descreveo esta doença com alguma precisão, e creou d'algunha sorte o tratamento: depois d'elle apparecerão as preciosas indagações de Werlhof, de Lauter, de Senac de C., Medices de Comparetti, sobre tudo de Torti, que não somente descreveo com precisão o caracter das febres perniciosas, como propoz os preceitos therapeuticos que inda hoje nos servem de regra: os modernos pouco tem acrescentado ao que ha escripto por esses sabios. Ha numerosas variedades d'especies destas febres, descriptas pelos authores baseados no symptoma predominante, que mais fixa a attenção do Medico, e constitue o maior perigo da doença, porem não é raro apresentar-se com uma aggragação de symptomas graves sem predominancia, ou saliencia d'algun d'elles, porem se á gravidade dos symptomas se liga a exaggeração do estado frio, constitue a febre algida caracterisada por um frio intenso, durante o qual a face apresenta um aspecto cadaverico, grande agitação, gemidos, alito frio, sêde viva, vós fraca, pulso pequeno frequente, e irregular, a intelligencia regular. A noite pode provir no primeiro accesso, porem se escapa a ella, o calor se estabelece lentamente e em pequeno grão, algumas vezes não se estabelece o calor, ou succede promptamente a esse fraco calor excessivo resfriamento de toda superficie do corpo indicando violenta congestão interna: na intermittencia os doentes sentem-se prostrados.

A febre diaphoretica caracterizada pela predominancia do estado do suor, é uma das mais temiveis, porque communmente os dous primeiros estados se assemelham aos d'uma febre intermitente benigna, e logo que s'apresenta o suor os doentes se sentem abatidos, estado este, que cresce á medida que vae aumentando o suor que é copioso, expesso, e frio: os doentes accusão frio e suas forças se esgotão, o pulso é d'uma pequena extrema, a respiração anhelosa: se os doentes escapão á morte no primeiro accesso, é inevitavel muitas vezes no segundo. São estas duas formas sem duvida as que mais temos observado, e que mais commun é nesta localidade.

E logo depois a Comatosa, tambem chamada soporosa, letargica, carotica, apoplectica, caracterizada por um estado comatoso somnolento, que varia desde simples somnolencia até o carus o mais profundo, estado este, que pode s'estabelecer no primeiro periodo, porem que quasi sempre o temos visto apparecer no segundo, o pulso pequeno e lento como na maior parte dos casos temos observado, olhos lacrimjantes e fixos, palpebras immoveis e semiabertas, lingua humida e coberta d'un enducto esbranquiçado ou amarelado, outras vezes secca, com a ponta e as margens rubras, feições deprimidas e decompostas, responde com custo e incoherencia as questões que se lhe fazem, algumas vezes quer associar as ideias e cae em estupor: quando o accesso é intenso a respiração torna-se esterturosa, o sentimento e o movimento parece se extinguir completamente, depois de uma ou muitas horas cessa este estado, o conhecimento retorna ao doente até novo accesso.

A delirante caracterizada por um delirio mais ou menos vivo, insipiente no segundo estado, que vae diminuindo pouco a pouco para o terceiro, a morte pode provir bruscamente durante o delirio, ou então cahem em coma, e succumbem em um estado de insensibilidade completa. Esta forma nunca tivemos occasião d'observar.

A convulsiva caracterizada por diferentes variedades de convulsões tonicas, e clonicas, é rarissima e pelo menos só a temos observado em duas crianças, que apresentarão contracções irregulares dos musculos da face, e rotação forçada dos globos oculares, e as maxilas serradas, somnolencia, respiração difficil, pulso extremamente pequeno.

A Tetanica caracterizada pela tensão, ou rigesa tetanica, geral, ou parcial observada por Cas. Medicus, e outros.

A Cataleptica observada por Torti: a Epilectica por Sautter: a Paralytica, a Hydrophobica, descripta por outros, nunca podemos observar em nossa clinica.

A Cardialgiaca tivemos occasião d'observar em um preto, que apresentava uma dor viva atroz no epigastro e coração, acompanhada de grande anxiedade, vomitos frequentes, com desfalecimento e alteração profunda das feições, pulso pequeno, raro, e apenas sensivel, grande prostração, vista obscurecida, e respiração difficil, lingua esbranquiçada no centro, e rubra nas margens: symptomas estes, que s'apresentarão no primeiro estado.

A' Syncopal, que os auctores dizem ser frequente, é caracterizada por syncopes espontaneas, ou debaixo da influencia da mais ligeira causa, nunca observamos: assim como a asthinatica, dyspneica, e aphonica. Porem a Pleuritica e Pneumonia de que citão muitos exemplos os tratados de Pneumonia, temos observado algumas vezes no começo do inverno, ou no verão em seguida as chuvas, caracterizada por viva dor no peito, que augmenta pela inspiração e tosse, com dyspneias, escarros muçosos, ou muco sanguinolento.

tos, lingua seca, grande seccura, pulso pequeno e frequente á principio, mais tarde torna-se frequente e duro, precedida de frio mais ou menos intenso, e seguida de suôres mais ou menos abundantes, ao que se segue intermissão, durante a qual desaparecem os symptomas, sobre tudo os stethoscópicos para reaparecerem no accesso seguinte.

A' Colérica, ou dysenterica é caracterisada por uma viva dor, e calor no estomago e ventre, seccura de lingua, vomitos abundantes de materias biliosas de côr verde e carregada, frequentes digecções da mesma natureza, ou sero-sanguinolentos, alteração na vôz, pulso pequeno e fraco, lividez e frieza nas extremidades: esta forma mais ou menos modificada apresentou-se em algumas pessoas em o anno seguinte á epidemia da febre amarella, talvez devido ainda á influencia da Constituição Medica, que originou essa fatal molestia, e este anno já tivemos occasião d'observar um caso fatal.

Quanto á Hepatica, ou atrabiliaria de muitos authores antigos, não a descreveremos, porque parece não ser senão a Colérica, ou Dysenterica modificada.

Tambem descrevem os authores a Peritonica, a Nefritica, a Cystica, a Uterina rheumatismal, Ictérica, e Exanthematica, nunca observamos, e d'entre estas umas, como Grisole, supponho imaginarias, ou como Chomel e outros, que uma cephalalgia, dores articulares, um exantema cutaneo, sejam suficientes para imprimir a febre intermitente o caracter pernicioso.

MARCA.

Qualquer que seja a forma porque esta molestia se apresente é pouco regular e rapida, porque umas vezes os symptomas perniciosos começam com o accesso, o que é raro, outras durante o curso do segundo, ou terceiro estado, e quasi sempre se ligão ao typo terçan, e dobre terçan: a mais das vezes o paroxismo é caracterisado pelos tres estados, ou pode falhar um ou dous delles. Segundo Mr. Maillot as quotidianas podem se tornar perniciosas do terceiro ou sexto accesso, e as terçans do terceiro ao quarto.

O perigo cresce proporcionalmente com o numero dos accessos, e tem sido occasião d'observar mudança de forma, ou a reunião de duas ou mais no mesmo individuo.

ETIOLOGIA.

E' a mesma das febres intermitentes, ou antes parece ser a causa mais especial os miasmas paludosos.

DIAGNOSTICO.

Diagnosticó é facil todas as vezes, que qualquer dos symptomas graves ou perniciosos se apresentão em um dos tres estados, e esses estados são bem discriminados, entre tanto algumas vezes pode sobrevir bruscamente um symptoma grave qualquer, que se decipe facil, ou espontaneamente depois d'algumas horas, deixando o individuo no estado perfeito, ou quasi perfeito de saude: neste caso deve-se suppôr, ou temer uma affecção periodica perniciosa, e dirigir-se o tratamento neste sentido: outras vezes os estados passão inapercebidos, até mesmo ao Medico por ter imbuído a sua attenção em um symptoma grave qualquer: então deve-se recuar quando a febre inter-

mittente é acompanhada de um symptoma insolito, ou grave qualquer, qz quando se apresente uma actividade crescente nos seguintes accessos.

PROGNOSTICO.

O Prognostico é sempre de summa gravidade, e é tanto maior, quanto maior for o numero dos accessos, e mais proximos entre si, sobre tudo se ha tendencia á tomar o typo continuo: as formas Algida, Comatósa, e Colerica são as mais graves, o resfriamento e immobildade do corpo, a decomposição da face, a desaparição do pulso, são signacs de morte proxima.

TRATAMENTO.

Seguiremos a mesma ordem indicada nas febres intermittentes simples: assim logo que appareça o frio fazemos deitar o doente, mandamos administrar de tempos á tempos uma chavena d'infusão quente do cha de borragens, tilia, casca de laranja, senapismos nos pés, pernas e pulsos, clysteres de pimenta como fica indicado, ou banhos quentes com agua e cinza, ou mostarda, com o fim de reanimar a circulação capital exterior, e assim desvanecer a congestão interna: quando o resfriamento é grande mandamos dar 4 a 6 gottas de ammonia liquida em uma chavena de qualquer dessas infusões, que mandamos repetir de tempos á tempos até o apparecimento do calor, se ha nauseas e vomitos, dor epigastrica, administramos algumas gottas de laudano reunidas á uma das infusões acima ditas, se a seccura é forte preferimos agua gazosa, ou a poção ant-emetica de Riviere, mistura salina simples, ccsimento de seveda e grammia com acido sulfurico, ao que associamos gottas de laudano, e mesmo agua em pequenas quantidades, e se the diminuirá os cobertores: estabelecido que seja o suor, se terá todo o cuidado de mudar os lençõs, e camisas todas as veses, que forem precisas para prevenir o resfriamento.

Quando a forma Algida não cede á estes meios indicados mandamos applicar tijolos quentes nos pés, botijas d'agua quente, ou sacos d'areia quente, e insistimos nas bebidas quentes.

Quando Diaforetica mandamos applicar as seguintes pilulas.

Acetato de chumbo crystalisado.....	} 1 oitava de cada cousa.
Gomma arabe em pó.....	
Charope commun.....	

Para fazer 36 pilulas para tomar uma de duas em duas horas, ou então a dissolução de gomma arabe feita em infusão d'erva-cydeira 5 onças, com 6 grãos d'acetato de chumbo, e uma onça de charope commun, para tomar uma colher de sopa de quarto em quarto d'hora: fricções com tinctura de quina composta, nos lombos, nas axilas, e parte interna dos braços e coxas.

Quando Comatósa alem dos dirivativos, sangria geral se o individuo é forte e sanguinio, se fraco ventosas excarificadas nos lombos, e cadeiras, ou bixas no anus, em ultimo caso visicatorio na parte interna das coxas, e insistimos com senapismos, e clysteres apimentados.

Quando Convulsiva os ant-spasmodicos associados aos calmantes: assim no caso das duas crianças de que fallei, empreguei com vantagem a seguinte emulção.

Agoa destilada de serejas pretas.	} a a 2 onças e meia.
Dita de funxo.	
Unguina arabe em pé.	2 oitavas.
Offo d'amenáo as dores.	meia onça.
Charope de castorio.	1 onça.

Para curar as colheres de sepa de instante a instante, fomentações com linimento volátil no dorso, e ventre, e insistentes nos senapismos, com o que desapareceo passado algum tempo esse estudo.

Quando Cardialgiaca alem do tratamento supra indicados, usamos a principio banos quentes sobre o estomago e ventre, ventosas seccas exarificadas, sanguisugas, fricções com linimento volátil, pomada nerval, ou epithemas de laudano rubifacientes sobre o epigastro.

Quando Colerica alem do tratamento geral, podemos nos servir dos meios indicados na forma precedente auxiliado com clysters amidonados, e adstringentes, ou emolientes com laudano.

Quando Pleuritica, ou Pneumonica, o tratamento da Pneumonia, ou Pleuresia, durante os accessos. Só o que quasi sempre succede no primeiro accesso, por parecer ser uma pleurisia ou pneumonia continua, e depois os febrifugos.

Na declinação, ou terminação do accesso, qualquer que seja a forma se administrará o sulphato de quinino em dose variavel segundo a intensidade do accesso, preferimos em alta dose, e aproximar quanto for possivel essas doses: assim costumamos applicar na dose de 20 grãos, e mais, e repetimos por mais duas vezes, na dose de 15 grãos para cada vez, e pode-se administrar concurrentemente clysters, ou pelo methodo endermico em fricções, com pomada amoniacal o ventre, que depois se cobre com sulphato de quinino, ou encorporada na inxundia de galinha, nas virilhas e axillas.

Preferimos empregar o sulphato de quinino em alta dose como aconselha Torti, e Bretonneau, porque como vimos atrás, o seo effeito é mais energico, e prompto, do que fraccionadas: e logo depois dos accessos como usava Tallot em sua pratica, seguida por Morton, e Bretonneau, porque temendo não se reproduzão os accessos em horas muito aproximadas, não haja tempo de ser absorvido o principio activo dessa substancia, que se opera lentamente, possa ficar de nenhum effeito a sua ingestão, ou mesmo tornar-se prejudicial aggravando os symptomas do accesso seguinte.

A salicina poucas vezes temo-la empregado, é sempre em dose igual á do sulphato de quinino, só, ou reunida á este.

FEBRES INTERMITTENTES ANOMALAS.

As febres intermittentes anomalas são aquellas, que apresentam formas diversas, e marchas muito irregulares, differentes das que acabamos de descrever. Mr. Chomel distingue em quatro especies, na primeira, que chama incompletas comprehende as que offerecem um ou dous dos tres estados das febres intermittentes regulares: assim Wolf diz ter visto febres caracterisadas unicamente por um frio periodico, Bartholin, por um augmento de calor sem frio, nem suor. Inquer unicamente pelos suores: na segunda especie comprehende as que os estados são confundidos, ou trocados, isto é, quando o calor s'apresenta no primeiro estado, e seguido pelo frio, como succedeo na Epidemia de Varsovia em 1700, ou vice versa: a terceira variedade comprehende a-

quellas em que o frio, calor e suôr, são limitadas á uma parte: a quarta variedade comprehende aquellas em que os accessos não são notados por algum dos tres estados, porem por um symptoma mais ou menos grave, que se reproduz em intervallos determinados, assim como dores em uma parte qualquer do corp., symptomas d'apoplexia, um coma, uma cardialgia. sêde, tosse, vomitos etc.

Se se mostrar periodicamente com o typo proprio das febres intermitentes, deve-se temer a sua gravidade, e promover o seu tratamento.

A' humã, o sulphato de quinino, e outros agentes febrifugos, serão empregados com igual vantagem á das intermitentes regulares, tendo cuidado de faser o doente mudar os habitos, genero de vida, e regimem.

Até aqui temos tratado da febre intermitente exsencial, no entretanto pode ser symptomatica á uma lesão local recente, ou antiga, assim muitos authores cita febres intermitentes regulares, em seguida á introdução de sondas na uretra. Giannini cita pela cauterisação d'um aperto na uretra. Sallemund á blennorrhagia, emfim. as supurações profundas, as infiltrações urinosas, a phthisica no segundo ou terceiro periodo, podem ser causa destas febres: nós mesmos já temos tido occasião d'observar dous factos destes no primeiro, coincidindo á uma fractura de perna, e no segundo, á uma ablação do perpucio. Estas febres apresentão os tres estados bem caracterisados, o seo typo segundo os authores, é quasi sempre quotidianna, ou dobre quotidianna, um grande numero são remittentes, assim segundo Chomel, será necessario quando o doente se queixar de febres dobre-quotidiannas, ou quotidiannas deve-se explorar todos os órgãos, e funcções para se conhecer a causa da febre. Dissem os authores, que se distinguem das symptomaticas primeiro, porque a febre quotidiana symptomatica d'accesso, sobrevem á tarde ou a noite, em vez de começar de manhã ou ao meio dia como na exsencial, entretanto nas febres symptomaticas, d'uma alteração das vias digestivas, o apparecimento do accesso é subordinado á hora da comida, e a quantidade dos alimentos ingeridos, as febres intermitentes symptomaticas differem ainda, por não existir durante o accesso augmento de volume do baço, e pela acção lenta, duvida-se ou quasi nulla da quina e seus preparados.

Qualquer que seja a acção da quina é provavel que não se possa colher bom resultado, e mesmo produzir alguns inconvenientes nos casos de coincidência com uma blennorrhagia, introdução de sonda na uretra, á uma interite, ou outra qualquer causa inflammatoria, se dará o sulphato de quinino, porem com menos vantagem logo que se liga á existencia de tuberculos pulmonares, ou infiltração urinosa.

FEBRE REMITTENTE.

Chamão-se febres remittentes as que apresentão uma marcha intermedia ao typo continuo, e intermitente: ella offerece no seu paroxismo como typo intermitente os estados de frio, calor, e suôr, e como as continuas symptomas, que persistem durante todo o curso da molestia. porem distingue-se desta, por apresentar intervallos determinados, de remissão mais ou menos completos, seguida d'um paroxismo, affectando muitas vezes o typo quotidiano, ou terçan, e d'aquellas, porque o intervalo de remissão é apenas sensivel, ou muito curto nestas, emquanto que o intervalo da apirexia é bem patente nas outras.

El de todas as apirexias a mais antigamente descripta, della fallou Hippocrates como prova Mr. Littre estabelecendo parallelo entre as observações, e d'estrinções deixadas por Hippocrates, e as recentemente publicadas sobre as febres d'África por Mr. Maillot, e as do Ganges por Tivining, e do continente Americano por Stewardson, emfim mais tarde M. Mr. Roux e Pallas testemunhio, que á 22 seculos a Grécia foi o Theatro das mesmas febres do tempo de Hippocrates, por elle descriptas, e que não são outras se não as remittentes, e pseudo—continua dos climas quentes.

ETIOLOGIA.

É propria dos Paizes quentes, e ataca mais aos homens, que as mulheres, sobre tudo aos adultos: pode seguir-se á uma insolação prolongada, sobre tudo depois dos individuos s'acharem submettidos á humidade, porem a causa que mais influe no seu desenvolvimento parece sem duvida ser paludosa, sobre tudo na epoca em que é maior o calor atmosphérico, como nós mesmo temos tido occasião d'observar: esta febre é frequente nas Indias Orientaes e na Africa, sobre tudo nas Costas Occidentaes, na America, com profusão nas Antilhas, na Carolina, emfim na Europa, nos Estados os mais meridionaes, sobre tudo na Grécia, e nos departamentos onde existem pantanos.

SYMPTOMAS.

A febre é as vezes remittente desde seu principio, porem temos visto começar por uma febre intermitente ordinaria, que depois se vae prolongando, e aproximando de mais a mais os accessos, até tomarem o typo remittente: quando é premitivamente remittente o doente começa por sentir languidez, oppressão precordial, dôr ou cansaças na parte lateral, e posterior do pescoço: a febre é precedida do resfriamento das extremidades, e por frios mais ou menos intensos, e lividez da face, nesta occasião o pulso é pequeno, frequente e deprimido. Quando a febre s'estabrece é com intensidade, e a maior parte das vezes é acompanhada d'uma dor mais ou menos viva no epigastro, e para um ou outro hypochondrio, especialmente o esquerdo, symptoma notado por Hippocrates, e comprovado por Stewardson: na maioria dos casos o pulso é frequente e cheio alem destes symptomas citados pelos authores, temos notado—quasi constantemente dores na fronte e temporas, contusas, nos braços, cadeiras, e pernas, que desaparecem com remissão.

Todos os authores depois de Hippocrates tem notado secura de lingua, que se desenvolve rapidamente do segundo ao quarto dia, a sede moderada, porem temos observado muitas vezes intensa desde o começo da molestia, appetite nullo, na maior parte dos casos sobrevem vomitos ao terceiro dia, outras vezes antes, ou mais tarde, frequentes, beliosos de côr verde, as digestões, que dizem ser ordinariamente regulares: porem muitas vezes ha constipação de ventre, ou diarrheia, a secreção urinaria, que diz Crisole nada ter de notavel, temos observado na maioria dos casos escasez, acompanhada d'uma côr amarella carregada.

Estos accidentes e sobre tudo a febre, existem d'uma maneira continua, exasperando-se regularmente, parecendo essa aggravação semelhante á um accesso de febre intermitente ordinaria, annunciando-se como dissemos por frios intensos, ou por um simples resfriamento do corpo, sobre tudo das extremi-

dades, acompanhado muitas vezes d'uma côr acinzentada ou livida: e durante a exacerbação que apparecem os accidentes perniciosos, sobre tudo symptomas cerebraes, como delirio, e coma: o paroxismo pode apresentar modificações em relação a certas circumstancias individuais, assim pois nos individuos debéis, e gastos por trabalhos ou excessos, a reacção não é tão franca como nos robustos em que o calor é consideravel, pulso vibrante, taca ingetada, dores vivas, vomitos frequentes, em quanto que nos outros o pulso é pequeno e molle, a palidez extrema, as extremidades conservão-se frias, e violacias mesmo durante o paroxismo, quasi sempre acompanhado de suores frios, e abundantes.

As exacerbações podem ter lugar á todas as horas communmente de manhã ou a tarde, é d'uma duração variavel ordinariamente de muitas horas, se terminão pelos suores, ou por uma ligeira perspiração, porem algumas vezes a remissão é obscura, e podem passar desaperecebidos de modo, que podem parecer continuas.

MARCHA.

A febre remittente nunca apresenta apyrexia, mais sòmente uma diminuição periodica nos accidentes, e sobre tudo na febre: algumas vezes de remittente torna-se francamente intermittente, outras vezes as exacerbações periodicas vão desaparecendo successivamente até tomar a forma francamente continua, o que quasi sempre se liga á alguma inflamação visceral.

Na maior parte dos casos as febres remittentes affectão accessos quotidianos, menos as dobre-quotidiannas, e rariissimo o typo tertan, ou quartan: ellas podem apresentar pela predominancia d'alguns accidentes, a forma remittente commum, ou vulgar, na qual se observa apenas os symptomas ordinarios da molestia, a remittente belica na qual predominão os symptomas gastricos, e que se assemelha mais ou menos a febre amarella. São estas formas as mais communs á esta localidade, emfim as remittentes perniciosas, aqui mais raras e caracterisadas por qualquer dos accidentes graves das febres perniciosas. estas febres são menos sujeitas as recabidas do que as febres intermittentes.

DIAGNOSTICO.

As vezes é difficil determinar com segurança a febre remittente, porque pode-se confundir com grande numero d'affecções agudas, acompanhadas de exacerbações, as vezes regulares, porem distinguem-se porque nessas exacerbações das molestias agudas não se apresenta o frio ou outro phenomeno com que principião as febres remittentes, e os suores finaes que a julgão, porem como em alguns pode fallhar um dos estados, para não confundir, se deverá ter em vista se a doença principia por intermittencia, assim como a existencia simultanea, com febres intermittentes, o paiz e estação em que s'observa.

Com a febre amarella da qual distingue-se por não apresentar a coloração amarella da pelle, e nem vomitos negros, assim como porque na febre amarella a lingua é humida e limosa, e não apresenta a rapida secura, que s'apresenta na remittente, e o resfriamento das extremidades.

PROGNOSTICO.

O Prognostico varia segundo certas circumstancias como a idade, constituição, affecções chronicas, e brevemente as ações digestivas.

Para se estabelecer deve-se ter em vista os symptommas predominantes, com a exacerbação, e a sua intensidade aos accidentes cerebraes, o resfriamento das extremidades, a cor livida, ou violacia da pelle, signaes estes de máo agouro: independentemente destes signaes, a febre remittente é sempre uma affecção grave, e é uma das principaes causas da mortalidade nos climas quentes.

TRATAMENTO.

A febre remittente comprehende alguns meios accessorios, assim as emissões sanguinias geraes e locais: as primeiras dizem ser funestas em qualquer, que seja a epoca em que se pratique, por serem na maior parte das vezes seguida de eupasos, e até mesmo as segundas, segundo M. Mr. Roux, e Pallas, porem n'alguns temos uso do das sangrias geraes no comesso do primeiro, ou segundo paroxismo, como aconselha Twining, com utilidade sempre, que os individuos são fortes e sanguinios, e as locais sempre, que a dôr dos hypochondrios, e epigastro é grande, e mesmo sangisugas atrás das orelhas, e ventosas na nuca sempre, que existem symptommas cerebraes, fumentações insistentes, ou contra-estimulantes, e narcoticas sobre o estomago, e hypochondrios, senapismos nas pernas, pès, coxas, e pulsos, banhos quentes com cinza, ou mostarda aos pès, bebidas quentes ant-spasmodicas, ou calmantes durante o primeiro periodo, no segundo, em pequenas doses bebidas frias, temperantes e gasosas, e clysteres catharticos, visicatorios nos hypochondrios, e epigastro todas as vezes que as dores são vivas, e ha grande oppressão e irritabilidade do estomago, na remissão o sulphato de quinino nas mesmas formas, e doses que indicamos nas febres intermittentes, assim para os cazos benignos, como para os graves, e perniciosos.

NATUREZA.

A vista do que fica dito, vê-se a analogia, que existe entre estas febres, e as intermittentes, umas e outras são oriundas da mesma causa, os symptommas, e marchas são communs, e com igual vantagem tratadas pelo sulphato de quinino, parecendo não differir entre ellas, pensa Baumes, Maillot, Nepple, e outros, explicão a remittencia pela irritação, ou inflamação visceral, no entretanto as indagações pathologicas não teem achado lesões que a expliquem: emfim as indagações de Mr. Leonard e Folley sobre a composição do sangue excluem toda a idéa de phlegmasia, querem muitos que seja symptomatica de lesões de baço ou fígado, porem se attendermos que essa lesão pode existir sem febre, que ella falta no primeiro estado, que pode diminuir, ou desaparecer com a remissão, temos por tanto que é infundada esta opinião, porque parece antes o augmento de volume dessas viceras, um symptoma concomitante ou consecutivo, do que causa da febre dependente de uma infecção, ou alteração particular do sangue.

REGIMEM HYGIENICO DAS FEBRES EM GERAL.

Primeiro todo o febricitante deve hir para o leito, e ahi procurar o repouso do corpo e espirito, regra que a mesma natureza prescreve, porque toda febre se acompanha de sentimento de moleza, e prostração, resultando da situação horisontal o pulso tornar-se mais calmo, e a circulação mais uniforme, o que permite a natureza empregar todas as suas forças para deminuir ou mesmo curar a febre. Segundo, o doente deve ser suficientemente cuberto, e guardar a maior tranquillidade de espirito. Terceiro, pode beber agua simples, ou misturada com diferentes substancias medicamentosas, indicação imposta pela natureza, em consequencia da sede, que acompanha á todas as febres. Quarto, todo febricitante deve-se abster de comer, é ainda um preceito natural, entruido pela perda do appetite, alem de que a natureza não terá força para digerir esses alimentos ingeridos, e que concorrerão para formar saburras no estomago, e só a doença, e não o doente se nutriria: enfim só se permitirá depois de passar a febre algum tempo, se o doente experimentar fome, satisfazê-la com substancias innocentes, de facil digestão: se nas febres intermitentes, regulá-la de forma, que a digestão esteja terminada antes do accesso que deve sobrevir. Quinto, o ar deve sempre ser fresco, e puro, meio este preciso para deminuir o movimento febril, e para prevenir a digenerecencia da febre, de simples em putrida: o melhor meio de entreter a pureza do ar é de o renovar dando accesso ao de fora. Sexto, é necessario que o doente conserve sempre o ventre livre.

DIARRHEA.

O tubo intestinal é muitas vezes affectado de fluxo mucoso, ou catarral geralmente sem dor e nem febre, o que constitue a diarrhea.

CAUSAS.

Esta affecção encontra-se em todas as idades, aqui temos observado ser mais commum nas crianças: é provocada pelas más agoas, má alimentação, calor, humidade, mudança d'estação, e vermes intestinaes, são estas as causas, que nesta localidade parece influir no desenvolvimento desta molestia, não só porque coincide aqui com o principio do inverno, como porque temos visto casos de diarrheas, rebeldias a todo tratamento, cederem depois da expulsão dos vermes: alem destas causas attribue-se com razão o resfriamento dos pés e de todo corpo, a suppressão do suor, mudança brusca de temperatura, e a excessos de mesa etc.

SIMPTOMAS.

A' diarrhea é caracterizada por digecções liquidas, amarelillas, mucosas, abundantes quasi sempre sem colicas.

N'alguns individuos é precedida de dores no ventre tenesmo, porem mais geralmente temos observado ser acompanhada d'inapetencia a sede viva, o ventre entumecido e sonôro, e sendo a sede de borborygmos: o symptoma predominante consecutivo á diarrhea, e a fraquesa mais ou menos grande em relação a maior ou menor abundancia das evacuações. Ella pode seguir uma marcha aguda ou chronica, no primeiro caso se terminara em um ou alguns

dias, e no segundo se prolongara á semanas, com alternativas e é muito sujeita á recahidas.

DIAGNOSTICO.

A diarrhea differe da interite pela ausencia completa, ou quasi completa da dor e da febre, e porque em muitos casos as funcções digestivas não se perturbão.

PROGNOSTICO.

(Feralmente é uma affecção benigna, porem n'alguns casos quando é excessivamente abundante e continua, pode dar lugar as consequencias da fraqueza, e podem pôr em risco a vida do doente.

TRATAMENTO.

Bebidas emolientes e gommosas ou aromaticas, só ou associada ao opio, clysteres e fomentações da mesma natureza, banhos mórnos, cataplasmas emolientes: quando chronica recorremos aos purgantes salinos, aos adstringentes, e tónicos unidos ao opio, e ao amido em bebida, pilulas, e clysteres, visicatorio na parte interna das coxas, compressão ligeira de ventre por meio d'uma cinta, especialmente de lã, se é attribuida a impressão do frio humido.

DYSENTERIA. COLITE, TENESMO E FLUXO INTESTINAL.

E' difficil dar uma boa definição, não estundo os authores d'accordo sobre a patogenia, e caracteres anatomicos desta affecção, imitaremos Sauvages que diz, "*dysenteria est freuens terminosa et mucoso-cruenta alvi degectio*," por tanto definiremos a molestia, pela enumeração dos seus principaes symptomas.

E' uma doença caracterisada por colicas mais ou menos vivas, e desejos frequentes d'obrar, acompanhados de tenesmo, assim como por uma excreção variavel d'um mucó sanguinolento, algumas veses em pequena quantidade acompanhada de febre.

HISTORIA.

A' dysenteria é conhecida desde'a mais alta antiguidade, e estudada com mais cuidado no seculo passado por Pingle, e Zimmermann, e no presente por Chomel, Pinel, Foillat, Guerin e outros, muitas tem sido as divisões propostas pelos authores, e dividiremos como Grisole em benigna e grave, em febril e apyretica, em sporadica e epidemica, em aguda e chronica.

CAUSAS.

A' dysenteria é commum á todas as idades especialmente a idade adulta, e á velhice, á todos os Paizes especialmente aos intertropicães, sobre tudo nos lugares pantanosos, e á todos os lugares em que reina um calor humido como aqui observamos: endemica annualmente tomará a forma epidemica na epoca em que maior grão de calor activa as emanções paludosas: podem ser produzidas tambem pela comita de má qualidade, e indigestas, pelos frutos verdes, pelas agoas de má natureza, pelo abuso dos drasticos, pela

inspiração de gases mefíticos, pela impressão do frio, indigestões, emoções moraes etc.

SYMPTOMAS, E MARCHA DA DYSENTERIA BENIGNA.

Muitas vezes esta affecção apresenta-se sem prodromos, outras vezes ella é precedida durante horas ou dias de moleza, cansaço, frios, e desarranjos de funções digestivas, incomodados estes seguidos de dores abdominaes, quasi sempre para o S. ilíaco, remontando depois as outras partes do cólon, ou então geraes e moveis se concentrando na fossa iliaca esquerda, e recto: muitas vezes esta dor s'exaspera com a pressão, os doentes accusão peso no pirinêo, e impressão d'um corpo estranho na parte posterior do recto, sentem falsos desejos de obrar, elles fizesem grandes esforços acompanhados de dolorosos puxos, sem nada expulsarem, no entretanto, de tempos á tempos expulsão uma pequena quantidade de materias, que na passagem do anus produzem um sentimento de ardor intoleravel, estas materias são formadas de mucosidades expessas, brancas, ou amarellas, sujas, sanguinolentas, e floconosas misturadas as veses por concreções brancas ou cinzentas, de um cheiro insuportavel: ordinariamente o numero das obras é mais ou menos consideravel, raras veses menor de dóse, em vinte quatro horas e temos visto se elevar a trinta e mais, estado este que parece influir nos órgãos genito-urinaes: assim geralmente ha frequentes desejos de urinar, muitas veses falsos ou seguidos da expulsão de pequena quantidade d'urina, ou de uma mucosidade esbranquiçada.

Por muito benigna que seja esta doença, é acompanhada de grande debilidade, a face torna-se ordinariamente palida, e abatida, o appetito diminui, a boca pastosa e amarga, a sede viva, o pulso frequente, e o calor augmenta, depois de ter persistido um ou mais dias vê-se as colicas e tenesmos diminuírem, assim como a diarrheia que vae passando de mucosa á stercoral, muitas veses a diarrheia substitue a dysenteria, enfim, as funções passado algum tempo voltão ao seu estado normal, restando apenas um certo grão de fraqueza.

SYMPTOMA, MARCHA, E TERMINAÇÃO DAS DYSENTERIAS GRAVES.

A forma grave é quasi constante quando reina epidemicamente. se. bre tudo nos Paizes quentes, nos navios, prisões, e nos campos, ou cidades sitiadas: nestes casos as dores tornão-se mais atroses, os puxos, e obras mães incommodos e frequentes, as materias expelidas da mesma natureza, porém mais ordinariamente se torna umas veses arroçadas, negras e puriformes, outras veses são serosas, mais tarde comparaveis a lavagem de carne, d'um cheiro fetido e insuportavel.

Diz-se mesmo apresentar pelliculas diphthiricas das pseudo membranas, e mesmo porções d'intestino, o que é confirmado por Mr. Cateloup, e Cambay, e affirmão mesmo ter visto ser expulsado selindros formados pela mucosa intestinal, e mesmo da tunica musculosa que alguns authores attribuem a fleugmões sub-mucosos, que algumas veses tem lugar na dysenteria dos Paizes quentes: nestes casos a dor é surda, e fixa a um ponto qualquer dos intestinos grossos, não se revelando se não pela pressão, ou quando o doente vae

obrar, então se exaspera, e se propaga á todo abdomen, emfim. os doentes algumas vezes de tempos a tempos obrão sangue puro e em abundancia.

Os symptomas geraes são em relação aos locais, assim a fisionomia torna-se profundamente alterada, a prostração é extrema e á sede inextinguivel, a respiração frequente, o calor intenso, e a pelle secca, as urinas raras, ou quasi suspensas, o pulso forte e amplo, outras vezes pequeno e concentrado, algumas vezes complica-se do estado ataxico, nestes casos existe delirio mais ou menos violento, tremores, e sobre-saltos tendinosos, outras do estado adynamico, neste caso a prostração é extrema, a lingua secca, e coberta assim como os dentes d'um enducto fuliginoso, o ventre creseido e meteorizado. Estas duas formas podem ser primitivas, ou consecutivas a uma reacção viva, com pulso forte, e desenvolvido, turgencia e rubor da face, symptomas que caracterisão a forma inflammatoria, emfim pode-se complicar da forma beliosa, então a lingua torna-se amarellada, a boca muito amarga, aneias, e vomitos de materias verdes. Esta forma e a adynamica são as que mais ordinariamente temos observado.

Qualquer que seja a forma se tem de terminar-se d'uma maneira funesta, a face torna-se de mais em mais alterada, as obras de mais em mais frequentes, e os tenesmos mais peniveis, o pulso pequeno e regular, o ventre meteorizado, todas as evacuações exalão um cheiro fétido, sobrevem soluços, o emagrecimento torna-se rapido, e a morte sobrevem, outras vezes d'improviso ha uma hemorrhagia intestinal, ou ha um peritonite aguda consecutiva, perfuração dos intestinos: outras vezes succede á estes symptomas melhoras progressivamente maiores, até terminar pela cura.

Uma das complicações mais constantes é a hepate como muitas vezes temos observado, e é comprovado pelas observações de Annesley na India, por Cambay na Africa, e outras, as recahidas são frequentes, algumas vezes espontaneamente, porem ordinariamente em seguida ao desvio do regimen, algumas vezes o eterno affecia o typo das febres intermitentes, sobre tudo o typo terçan.

A' convalescença das dysenterias graves é sempre lenta e difficil, por que em razão da eminencia das recahidas, os doentes são obrigados á moderar o regimen alimentar.

DYSENTERIA CHRONICA.

Aqui rara, dizem ser mais frequente no tempo d'epidemia, caracterizada por dor e tenesmo, ventre tenso, e meteorizado, ou retrahido, as materias excretadas algumas vezes sanguinolentas, com aspecto purulento, o appetite é nullo, ou irregular e voraz, o que concorre muitas vezes para perpetuar a molestia, raras vezes segue uma marcha regular, ordinariamente apresenta alternativos de exacerbação e remissão, no entretanto o emagrecimento faz progressos, sobrevem infiltrações, e no meio do marasmo chega a morte, conservando os doentes as faculdades intellectuaes no estado de integridade, e pode-se observar nesta forma as complicações hepaticas da forma aguda.

DURAÇÃO.

A dysenteria tem uma duração mais ou menos longa: quando benigna termina de quatro a oito dias, na grave a duração varia d'um á tres septenarios, raras vezes a morte chega antes de oito a neve dias nas epidemias tem-

se visto os doentes morrerem no terceiro: a forma chronica tem uma duração indeterminada, ella pode durar semanas ou mezes, e dizem mesmo poder durar annos, quando ella é pouco intensa.

DIAGNOSTICO.

As dôses, o tenesmo, a excreção laboriosa d um muco sanguinolento, são os symptomas que caracterisam esta affecção, porem pode-se observar em certo grão no cancro do recto, nas hemorroidas internas ulceradas, no enterito, tanto existe entre estas affecções e a dysenteria, tao grande differença, que não é possível confundi-las, com a colica saturnina, e o cholera-morbus, e com a interite, porem nestas affecções as evacuações são verdes, amarellas ou brancas, em grande quantidade e sem tenesmo, em quanto que na dysenteria são sempre pouco abundantes, serosas, muccosas, puriformes, e mais ou menos misturadas de sangue.

PROGNOSTICO.

A dysenteria simples, sobre tudo sporadica, é quasi sempre de bom prognostico, porem quando grave, e epidemica sobre tudo em grandes reuniões de homens em climas quentes, são sempre pela maior parte fataes.

A decomposição das feições, a prostração, pequenez do pulso, os soluços, as dições letidas, negras ou puriformes, a expulsão de membranas intestinaes, são symptomas de grande perigo, a chronica tambem é de grave prognostico quando reina nas prisões, hospitaes, e em todas as grandes reuniões de individuos.

TRATAMENTO.

Logo que se desenvolve a dysenteria, deve-se procurar afastar as causas que a determinarão, assim se destruirão, os focos d'inflacção se diminuirão, os doentes se preservarão das variações atmosphericas, porem se deverá frequentemente renovar o ar do quarto do doente, e conservar o maior aseo possível, e mesmo usar-se de fumações desinfectantes.

Quanto ao tratamento Medico deve variar conforme o caracter da moléstia: quando a dysenteria é benigna aconselha-se temperatura suave, e abstinencia completa de alimentos, bebidas mucilaginosas, banhos, clysters e cataplasmas emollientes, só, ou reunidos á opio, que se pode usar em pilulas, com o que temos tirado sempre vantagem nos casos de dysenteria pyretica, desembaraçando previamente as primeiras vias pelos evacuaes, como aconselha Pringle. E quando se apresenta grande reacção febril, e dores agudas, precedendo a sangria geral e local á sua admissração, os evacuaes serão geralmente empregados no seculo passado, porem nã os empregamos quando existem symptomas de embaracço gastrico, e julgam os que o emprego dos emeticos, e purgativos deve ser subordinado á um genero epidemico.

Nas dysenterias malignas ha casos, em que os anti-flogísticos são uteis com prudencia, quando ha prostração de forças e tonicos são d'utilidade, quando sobrevenem accidentes ataxicos a carfora, os banhos, e bebidas emollientes e aromaticas: tem-se preconizado a nãx vomica, o tabaco, o aceto do chumbo, o sulphato de quimmo, e outros, porem entendemos, que estes medicamentos devem ser empregados com reserva, á excepção do quimmo, que

sempre nos tem sido de utilidade, quando a dysenteria se reveste de caracteres da febre perniciosas.

Se a dysenteria é chronica os tonicos, e adstringentes, sós, ou reunidos aos emollientes gommosos, e mesmo ao opio. Na convalescença deve-se insistir no uso dos meios á que a molestia cedêo, e evitar cuidadosamente a falta de regimem, e a impressão do frio.

NATURESA.

Differentes tem sido as theorias, que tem apparecido para explicar a sua natureza: Cœlius Aurelianus a suppoz reumatismal mais tarde outros, de natureza catarral: alguns Medicos Alemães tem pretendido achar analogia entre ella, e o croup: Zimmermann, e outros praticos a suppoz devida a presença de uma bilis, com propriedades deletérias, determinada por um orgasmo particular do figado: Linco, a existencia d'um acarus intestinal: Huxam, Wigler, e outros á suppoz de natureza febril, e chamavão-na filha da febre intermitente, muitos Medicos a consideravão de natureza francamente inflammatoria: Rostan é desta opinião, porem admitindo uma natureza morbida especifica: Mondiere ultimamente attribue ao sangue despojar-se de seus principios albuminosos. Em quanto á nós, attendendo a natureza dos symptomas, e as suas causas produccentes, somos inclinado á julgá-la de natureza flegmasica especifica.

FEBRE AMARELLA.

Não descrevemos esta terrivel affecção porque já o fizemos em nossa *Memoria* publicada em 1853 pelo que a ella pode o leitor recorrer.

CHOLERA ASIATICO. CHOLERA-MORBUS.

O Cholera epidemico, ou asiatico, é uma affecção caracterizada por vomitos, e dejecções de materias aquosas estranquiçadas, semelhantes a agua d'arroz, suppressão da secreção urinaria, ausencia do pulso, resfriamento quasi glacial do corpo, cor violacia dos tegumentos, que se tornão molles e enrugados em consequencia do rapido emagrecimento, e finalmente por uma grande oppressão, e por frequentes e dolorosas cainbras dos membros.

HISTORIA.

É uma molestia conhecida de remotos tempos nas Indias Orientaes, e parece ter uma origem semelhante as affecções, que precedentemente assignamos. Segundo a maior parte dos Medicos Ingleses, que a tem observado nos lugares em que ella reina, a considerão como o resultado d'uma intoxicação palustre. Muitas vezes tem-se visto franchear seus limites naturaes, e ir exercer os seus furtores ao longo, porem a mais ingente, e mortifera das epidemias conhecidas, foi a que começou perto do Ganges em 1817, que successivamente invadio a Asia, Africa, Europa e America, lavrando em 15 annos mais de tres milhões de leguas quadradas.

Esta temivel molestia tem sido objecto contra a qual se tem preconisado um sem numero d'especificos, porem é forçoso confessar, que o verdadeiro

especifico do Cholera, se existe, ainda não é conhecido: por tanto, força e seguir o methodo de tratamento, que as circumstancias de cada doente indicarem como melhor.

ETIOLOGIA.

Muitas observações provão, que o estado humido da atmosphera, é uma das circumstancias, que mais favorece o seu desenvolvimento: as margens dos rios, lagos, e pantanos, como muitos observadores attestão. variações da atmosphera, agglomeração de pessoas, miséria e consternação publica, ruas estreitas e immundas, casas sujas e mal ventiladas, a idade adulta, sexo feminino, privações, excessos, trabalhos, rudez, insolações, resfriamento, indigestões, porém parece mais racional devido á uma causa especifica espalhada na atmosphera, ainda ignorada, e de demonstração difficil, cuja causa opera epidemicamente, e não por contagio, como geralmente com rasão se crê, e nós procuraremos quanto for possivel provar com as nossas debéis forças, e limitados recursos.

(1) Cholera poderá ser considerado uma affecção contagiosa?

A' não ser, seraõ d'utilidade as quarentenas, cordões sanitarios, e Lazaretos?

A' similhante respeito militão duas classes de pugnadores, uns, que sustentão ser esta affecção contagiosa, e outros com mais sincero fundamento e rasões a considerão epidemica. Estes baseão-se nas seguintes rasões.

1.º Que as pessoas que se achão em mais immediato contacto com os doentes como Facultativos, Enfermeiros, pessoas intimas, são os que, segundo as numerosas observações feitas em muitos Hospitales da Europa, e da Asia, com raras excepções, menos soffrerão nas anteriores epidemias: assim o senhor Candido Albino da Silva Pereira e Cunha diz, (a) que em 1835 no Hospital de S José em Lisboa, existião 6 Frades Camillos, no de Belém 2, no da rua da Rosa 2, no de Santa Appollonia 2, e os existentes no convento andavão de continuo á prestar socorros aos enfermos, e nem um d'elles succumbio ao Cholera, apenas o Padre Procurador teve uma Cholera ligeira.

2.º O Cholera defere essencialmente das molestias contagiosas por n'ella não existir virus como na syphilis, sarna, bexiga etc, e porque as inoculações tentadas por diferentes Medicos, que votando-se generosamente ao bem da humanidade, e ao progresso das Sciencias, se hão submettido á experiencias as mais asquerosas, e arriscadas, entre os quaes se assignalão Mr. Foy, Mr. Sandras, Mr. Uverat e outros, que provarão o vomito, e se inocularão com diferentes materias dos Cholericos como sangue, dejeções alvinas etc, que sempre hão apresentado resultados negativos, ou nem um resultado funesto: (b) em quanto, que as molestias contagiosas, logo que inoculadas, reprodusim na maioria dos casos uma molestia similhante. Além d'isso tem-se verificado, que crianças podem mamar impunemente durante o periodo cyanico, e que Medicos durante as epidemias tem procedido á abertura de cadaveres Cholericos, com a mais escriptulosa indagação sem a contrahir.

3.º A maneira rapida porque o Cholera se propaga nas grandes povoações, accommettendo n'um curto espaço de tempo um maior ou menor numero d'individuos collocados em longinquas distancias, sem ser importada,

(a) Instituições d'Hygiene publica, Tm. 3.º pag. 219.

(b) Dictionario de Med. do Dr. Fabre. Tm. 2.º pag. 544.

como se verificou em 1817 em Londres, e em quasi todas as cidades da Europa, e da Asia, que se tornaram incommunicaveis por meio dos cordões sanitarios, todas se virão congeladas por este terrivel mal: entre as quaes se assignalao Berlin, que apesar de deixada por tres cordões de tropa, esta affecção a accommetto, e a muitas outras em que se tomaram precauções identicas como Nienleberg, Elbing, etc.

4. ° A maior parte dos Medicos, que tem observado epidemias do Cholera, affirmão ser precedida d'um periodo precursor, devido á um mal, ou causa especifica, espalhada na atmosphera de demonstração difficil, porem revelada pelos seus effeitos, á principio capazes sómente de produzir os linhamentos do Cholera, como diarrheas, e dysenterias: á qual mais tarde adquirendo maior actividade, se torna apto a produzir o Cholera: facto este admittido hoje universalmente, e que não pode ser explicado pelo contagio.

5. ° Na epidemia desta affecção é geralmente reconhecido tres periodos. 1. ° o de invasão, 2. ° o d'estado, ou augmento, e 3. ° o de declinação: e que durante o seu reinado pode offerecer recrudescencias devidas á elevação de temperatura, e muitas outras circumstancias, o que se não observa nas doenças contagiosas, e nem podem ser explicadas pelo contagio. Além de que as doenças d'este character quando não são atalhadas pela sequestração dos doentes, vão se desenvolvendo com um progresso espantoso, como se observa nas heixigas, e outras: em quanto, que á sequestração d'um ou mais individuos do lugar em que se desenvolve o Cholera, ou outra qualquer moléstia epidemica, é insufficiente para atalhar, limitar, ou extinguir. Assim como factos existem na Sciencia, de Cholericos postos em lugares salubres, e ali visitados, e curados sem que o mal se tenha communicado as demais pessoas d'esses lugares.

6. ° Na epidemia de 1817, como dissemos, diferentes Governos, especialmente o da Russia, aterrados, puserão em pratica os Lazaretos e cordões sanitarios, não obstante ella zombou crachmente d'essas medidas, e devastou esses Paizes. Assim como no anno de 1832 em Paris, na prisão denominada Conciergerie, foram primeiro atacados pelo Cholera tres criminosos, que ali existião incommunicaveis, e no mais profundo segredo: factos analogos se citão de prisiones, em Londres, e parece, que estes lugares pouco communicaveis com o exterior, deverião ser preservados.

7. ° A Sciencia se acha pejada de factos do desenvolvimento d'esta affecção, sem que fosse transmittida, ou importada d'outras partes: assim lê-se o seguinte facto (a) O Navio New-York largou do Havre de Grace em 9 de Novembro de 1848, onde não existia esta doença, levando á seu bordo 385 pessoas com excellente saúde: não communico pelo caminho com embarcação alguma, no entanto no meio do Oceano apparece um caso fatal de Cholera no dia 25 do mesmo mez, e por tal forma foi atacando, que até o dia 1. ° de Dezembro em que atordoa á Ilha de Sutter, onde foram desembarcados para o Lazareto, tinha accommettido á 7 doentes: do dia 3 ao dia 7 declararão-se 15 casos, d'estes havião 4 que ja estavam no Hospital antes da entrada do Navio, e que communicarão com os passageiros: no dia seguinte um convalescente que tinha estado por 24 horas no Lazareto, e que morava no interior da Cidade, foi atacado do Cholera, e conduzido logo ao Hospital do Lazareto.

(a) Jor. das Sci. Med. de Lisboa. Tm. 1. ° pag. 310.

No dia 11, um Alemão, que não tivera comunicação alguma com os passageiros, mas que morava com este, foi atacado, e um outro, que nem tinha communicado com os doentes, e nem com os passageiros, é atacado n'uma rua proxima da precedente habitação. A epidemia continua até o dia 30 de Dezembro, neste dia cahio um grande nevão, o Cholera desapareceu completamente, para ressurgir em 19 de Janeiro de 1849 com a elevação de temperatura. Pelo que se vê, que o Navio tendo sahido d'um porto limpo, e sem doentes a bordo, sem ter communicado com porto ou embarcação alguma, no meio do Oceano se desenvolveo n'elle o Cholera: e que depois do desembarque 24 horas, principiarão a ser affectadas pessoas, que com os passageiros communicarão, e que mais tarde se estendeo á pessoas, que com os Cholericos não tinham tido a menor communicação.

Candelo Albino diz (a), que se lê no Relatorio do Collegio dos Medicos da Philadelphia, que uma embarcação de guerra da Gran-Bretanha, tendo sahido de porto sano e sem doentes, sem que tivesse communicado com a terra, ou embarcação alguma, ao chegar defronte de Bombaim, onde reinava o Cholera, antes de communicar com a terra, cahem cholericos uns poucos d'individuos á bordo.

Diz mais, que em 1818 appareceo o Cholera em Madrastra, tanto ao norte, como ao sul: ora ao norte a navegação era livre, e poder-se-lia dizer, que a epidemia poderia ter sido importada por algum navio, mas da sua appareição ao sul, se não podia dar a mesma explicação, pela falta absoluta de monção: no Relatorio da Mesa Geral de Saude de Londres, se lê o seguinte facto (b). Que quando em 1848 o Cholera atravessou a Europa, já sufundio muito menos terror, do que em 1832.

Em Hamburgo 360 doentes atacados d'esta terrivel molestia, forão recolhidos no Hospital geral, sem que elle ali se propagasse á outro algum, de 1600 doentes ali recolhidos.

Em Inglaterra a mais de mil crianças pobres, entre as quaes o Cholera tinha grassado havia semanas, forão mandadas distribuir nas respectivas Freguezias em Londres, d'estas mais de 300 adoeceirão, porem sem communicar a doença as pessoas entre as quaes viverão.

Experiencias mandadas fazer pelo Governo de S. Petersburgo (c), para verificar se o Cholera é, ou não contagioso: para o que quatro condemnados á pena ultima forão deitados em camas, onde tinham jasido, e expirado outros tantos Cholericos, e nem um d'aquelles apresentou o mais pequeno symptoma da molestia.

Passados tempos disserão-lhes, que se hião deitar em camas onde tinham morrido Cholericos, mas que se tivessem a fortuna d'escapar, lhes seria perdoada a pena, e restituida a liberdade, porem n'essas camas não tinham existido cholericos: no entanto o terror foi tal, que ao cabo de tres dias todos tinham expirado do Cholera.

8.º A autoridade e maioria dos mais celebres Medicos, que tem tratado em differentes partes do globo negão com rasão, e guindos unicamente pelos sagrados deveses de sua profissão, e amor da sciencia, a transmissão do Cholera, por contagio. Annesley, e Bell attestão, que nas Indias geral-

(a) Instituições d'Hyg. Pub.

(b) Jorn. das Sci. Med. de Lisboa. Tm. 5.º pag. 233.

(c) Jor. das Sci. Med. de Lisboa. Tm. 4.º pag. 378.

mente com a maioria dos Medicos, e Letrados, se cré, que esta affecção é epidemica, e não contagiosa: e até exemplos ha de contagionistas reformados em suas opiniões.

Assim se-se no Relatorio citado, que o celebre Dr. Rush dos Estados- Unidos da America, tendo a alguns propagado a convicção de contagio, ultimamente em consequencia d'uns poucos d'annos d'experiencias da febre amarella, em uma obra nova, pedio perdão aos seus collegas, e a humanidade de ter emitido uma opinião tão errônea, e que finalmente não ha um só, dos entendidos na materia na America, Russia, Polonia, Prussia, Austria, Hollanda e França, que não ciamem contra tão errada, como prejudicial doutrina de contagio.

Os setarios da doutrina do contagio, fundão-se em observações exceptionaes, das quaes apresentaremos as principaes.

Assim dizem em favor de sua opinião, que esta affecção tem-se apresentado em diversos climas, estações oppostas, e seguindo á direcção dos rios, e movimento das massas, e neste sentido dizem, que penetrou até o coração da Russia, seguindo quasi sempre a rôta do Volga, rio navegavel, e de frequente commercio: e que na Polonia em 1830 appareceu esta affecção logo, que certo corpo do Exercito Polaco acampou em Bolimw, em lugar, que na véspera estivera uma divisão Russa: sendo de notar, que um destacamento collocado em frente d'este, e onde não tinham estado os Russos, fosse respeitado pela epidemia.

Na memoria sobre a epidemia do Cholera morbus, que grassou na Cidade do Porto, durante o sitio de 1832 á 1833, pelo Dr. Bernardino Antonio Gomes (a), se lê, que o Vapor London Marchant, que conduzia o general Solignac, e 200 Belgas vindos de Paizes affectados do Cholera, aportou na Foz do Douro no 1.º de Janeiro de 1833, contendo então de 10 á 12 atacados. O Inspector da Saude do Exercicio, mandando examinar os doentes, affirmo dar a sua opinião á respeito da conveniencia do desembarque, ou não desembarque, tendo declarado officialmente, que não era Cholera, forão desembarcados, recebidos na Foz, e transportados depois á Cidade para o Hospital do Anjo, d'onde regressarão para a Foz no mesmo dia. O Cholera appareceu n'esta epoca, primeiro na Foz, depois na Cidade, e Hospital dito, dissiminando-se depois pelas visinhanças.

Nas Instituições d'Hygiene publica citadas vê-se, que Dalmas diz, que na Prussia as Cidades de Marienwerder, e Graudons forão preservadas da epidemia, em consequencia das rigorosas medidas, que evitavão as communicações com os pontos infectados.

Na mesma obra, e no parecer da Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, mandado imprimir pelo Governo em 1832, para ser distribuido gratuitamente, lê-se, que a Cidade d'Alleppo foi acommettida pelo Cholera, na mesma epoca. E Mr. de Lesseps, Consul Francez, com todos os Francezes, que o quizerão seguir, se refugiaram em uma Quinta um pouco afastada da Cidade, onde se conservarão incomunicaveis durante a epidemia, e assim conseguirão ser respeitados.

Os Capitães dos Navios ancorados defronte de Manilha (Fillippinas) em 1820, onde então reinava a epidemia, prohibirão severamente todas as communicações com a terra, e nem uma de suas equipagens soffrêo.

Alem d'estes existem outros factos, porem que pelo seu numero, e outras circumstancias não podem servir para contrabalançar os numerosos factos em opposição, e por consequencia d'elles se não pode deduzir o caracter generico d'esta affecção, de propagar-se pelo contagio. Factos esses, que ainda assim podem ser satisfatoriamente explicados pela doutrina opposta.

Assim os argumentos de lúsidos do modo de propagação da molestia são dependentes de condições locais, e atmosfericas, que obedecem as mesmas leis de diffusão, por isso não admira, que em suas incursões, seguindo geralmente as mesmas Cidades, certas ruas de preferencia, e mesmo casas em que se não alteraõ as condições, em lugares outros pela primeira vez, em que se dão essas circumstancias, as quaes são, a evaporação d'agoas estagnadas pantanos depositos de materias putridas, ruas immundas, e estreitas, casas sem ventilação, e nem azeio, auxiliadas pelas bruscas, e grandes oscilações de temperatura da atmosphera. peso do ar, ventos humidos, falta d'evaporação, e electricidade, etc : por isso não admira, que de preferencia siga em sua marcha diferentes climas, e estações, e que possa apparecer em lugares em que não era esperada, e principalmente na direcção dos rios, porque n'esses lugares concorrem circumstancias capases d'infectar o ar: já por diferentes substancias organicas existentes nas proximidades das margens, já por outras ali lançadas pelas correntes d'esses rios, que alem d'isso formão estagnações em variaveis lugares, que podem occasionar o desenvolvimento d'esta affecção de preferencia nas margens, e direcção dos rios.

N'este sentido diz Mr. Adair Crauford na sua discripção sobre o Cholera asiatico, durante a sua permanencia em Tersburgo, que, quando em 1831 o Cholera rompêo no meio do Exercito Polaco, que combatia nas margens do Vistula com os Russianos, notou o Dr. Dalmas, enviado do Governo Francez para examinar e estudar os meios de curar aquelle mal, que nos corpos do mesmo Exercito, que occupavão posições baixas, e pantanosas na extensão do rio, o Cholera rapidamente augmentava: diminuindo apenas, que se reinovião para terrenos mais elevados: e que em 1832 nas margens do Tamisa, mais immundas, foi que o cholera se acendia, e era mais devastador: e o mesmo é attestado pelos mais classicos, e modernos authores.

Quanto aos dous factos seguintes, isto é, do apparecimento do Cholera no Exercito Polaco, e do Vapor London, e outros analogos, pole-se interpretar razoavelmente pela coincidencia de circumstancias atmosphericas concomitantes, capases de desenvolver a constituição epidemica, que mesmo podem respeitar á lugares proximos, conforme á sua posição, e boas condições de localidade. por tanto não admira, que o Cholera se desse no Exercito Polaco, e respeitasse o destacamento fronteiro. Alem de que as grandes reuniões d'homens, as privações, e desassocegos d'espírito, combinados com más condições atmosfericas, e de localidade, reunidas a corrupção do ar, proveniente d'essas grandes reuniões, fossem capases de desenvolver esta doença, já na cidade do Porto, já no Exercito Polaco, independentemente da transmissão pelo Vapor London, e pelo Exercito Russo.

Quanto ao facto das Cidades de Marienweder, e Graudens serem preservadas em consequencia das rigorosas medidas, não admira, e a isso respondemos, que se essas torão poupadas, muitas outras como citamos, apesar das mais rigorosas medidas, e da cessação completa com Países affectados, não impedirão a desenvolução do Cholera, e outros, que teem sido poupados, conservando a mais frequente relação com Países infectados. Sirva-nos

d'exemplo as Ilhas dos Açores, que não forão acomettidas pelo Cholera, apesar da communicação livre, que existia com o Porto, e outros portos estrangeiros infectados: por tanto, ceteris-paribus, este caso se podia dar nas duas cidades citadas, independentemente d'essas medidas.

Pelo que diz respeito ao facto d'Alleppo, já vimos, que por variaveis circumstancias, as epidemias podem respeitar certos lugares, e até mesmo certas habitações: o que tivemos occasião d'observar durante a epidemia da febre amarella, nesta localidade, e é attestado por muitos observadores.

Quanto ao ultimo facto não admira, por isso, que afastados do foco de infecção, e interrompidas as communicações com esse foco, se não desse caso algum.

Alem d'isso sem querermos desrespeitar, desconsiderar, e mesmo desconceituar alguns d'esses factos, alias apresentados por habéis observadores, como o que é apresentado pelo nosso ex Lente o Sr. Dr. Bernardino Antonio Gomes, todavia diremos, que talvez as circumstancias apresentadas não passem de meras coincidencias: e diremos mais (sem referrencia á elle), que infelizmente nem todos escrevem na melhor fé, porque, já interesses pecuniarios, já o receio d'embaraçar as vistas dos Governos, e por esta arte os desagrada, arrostar com prejuizos populares, paixões, e muitas outras circumstancias pode os indusir á occultar a verdade.

Finalmente, os factos apresentados pelos contagionistas são em tão pequeno numero, e tão fracos, que não podem contrabalançar a multidão, que existem em sentido contrario, e registrados na sciencia por abalisados Medicos: e alem d'isso a maior parte dos factos apresentados pelos contagionistas, podem ser explicados pela doutrina opposta, em quanto, que os factos d'esta não o podem ser pela doutrina do contagio.

Em vista do que, escudados com as observações, e autoridade dos mais sabios, e distinctos praticos da Asia, America, e Europa, regeitamos formalmente a ideia do contagio d'esta affecção, excensivelmente epidemica.

Sendo esta conclusão baseada no mais irrefragavel testemunho, e opposito as convicções d'aquelles, que não a observação em Paizes infectados, e nem s'informarão do que se tem observado n'esses Paizes, são seduzidos pelas circumstancias que apontamos, á sustentar ideias erroneas, e preconceitos em materia de tanta gravidade moral, e social, por tanto de da maior importancia, que o Governo e o Povo abandonem semelhantes ideias, que graves prejuizos podem acarretar a Nação.

Quanto aos Lazaretos, Quarcentenas, e Cordões sanitarios, são d'uma utilidade incontestavel logo, que a molestia seja realmente de caracter contagioso, porem no caso vertente em que é impossivel sustentar similhante ideia, em vista do que dissemos, e do que hão historiado um numero d'acreditados Medicos, temos, que não só são inuteis mas até mesmo prejudiciaes: primeiro, porque não sendo a molestia contagiosa, estas medidas por forma alguma podem impedir a sua desinvolução, e progresso havendo condições locais, que o favoreção, tornando-se por esta arte inuteis: segundo, prejudiciaes, porque é sabido, que nada ha, que predisponha mais o Cholera, do que o temor, que de necessidade se deve desenvolver nos animos timoratos logo que vêem se pôr em pratica semelhantes medidas: com perturbação esperão de dia em dia serem affectados pelo mal, por tanto temos, que logo, que se dêem condições atmosphericas favoraveis, pode o estabelecimento d'estas medidas favorecer a sua desinvolução.

Sem fallarmos nas rediculas praticas seguidas no seio d'esses Estabelecimentos, todavia diremos, que são extraordinariamente dispendiosos no Estado, um terrivel impedilio ao commercio, e á todas as relações dos povos, um grande transtorno aos viajantes, e ate mesmo um fóco originario de immoralidade, porque inculcando no animo do povo a ideia de contagio, os excita á fugir espavoridos, e á esquivarem-se de prestar soccorros, com a devida caridade aos enfermos, por tanto temos, que alem d'inuteis, são prejudiciaes e s'alguna utilidade tem, é unicamente por criar empregos e empregados, ou para alimentar interesses, e vistas particulares.

Citaremos em favor d'esta conclusão o seguinte artigo, extrahido do Relatorio da Mesa Geral de Saude de Londres, que diz, que a declaração jurada, de 24 Medicos Superintendentes de Lazaretos de diffrentes partes da Europa, rigorosamente inquiridos, depozarão nunca ter huido exemplos de morte, entre os espugnadores sanitarios, em consequencia d'haverem desenfardado sedas, algodões, coiros, e outras cousas chamadas suscepiveis, empacotadas, carregadas no meio da peste, e exportadas directamente para a Italia, França, e Inglaterra, descarregados, e logo abertos nos Lazaretos d'esses lugares.

Finalmente diremos, que a Inglaterra deixou-se de quarentenas, e pôz em vez d'ellas— boas leis de policia sanitaria interna: e os illustrados Governos da França, e Estados-Unidos, condemnarão estas chimericas precauções. E já em 1822 as cortes d'Hispanha regeitarão por consideravel maioria uma proposta de lei sanitaria, fundada na doutrina do contagio.

Em Portugal as prevenções de quarentena se simplificarão á um ponto, que por este meio preventivo foi ainda assim contemporisado, para modificar o susto das pessoas, que por ignorancia não podem avaliar os factos, e se deixão fascinar pelos prejuizos da doutrina opposta, por tanto é d'esperar, que os Governos do nosso Paiz attendendo a sinceridade da nossa exposição, cujas vistas são ver o nosso Paiz prescrever simillhantes medidas, pondo em pratica boas leis de policia sanitaria, e assim confrontar-se com as Nações cultas da Europa.

PROPHILAXIA DO CHOLERA.

De todos os meios ministrados pela sciencia, os Hygienicos são sem duvida os mais seguros preservativos d'esta affecção, e de sua fatal terminação: trataremos em primeiro lugar dos meios convenientes antes do desenvolvimento d'esta doença, em segundo dos cuidados que se devem empregar, aos signaes prodromicos d'esta affecção e em terceiro dos de que se deverão servir os doentes nestes e em outros casos d'epidemia.

MEIOS PROPHYLATICOS, OU PREVENTIVOS.

1.º Habitar em casas altas, espaçosas, claras, e arejadas, no interior das quaes, e suas dependencias, se deve manter o maior asseio.

2.º Humedecer os quartos todas as manhãs, o que se pode obter com uma parte de peróxido de manganês, duas de chlorureto de sodio (sal da cusinha), em uma capsula, ou tigela na qual se deve ir lançando de tempos á tempos acido sulphurico deluido n'agua, ou então espargindo agua de Lavbarraque por differentes partes.

3. ° Evitar as grandes reuniões, como Theatro, baile, etc., e prevenir a mudança brusca da temperatura quente, para a fria.

4. ° Conservar a maior limpeza possível, por meio dos banhos frios todas as manhãs, que além d'esta indicação subtrahê o calorico, e tonifica a pelle, ou tepidos em alto dia, e com cautela. Os vestidos, que se devem trazer no maior ajeito, devem ser largos, e de fasedas leves, porem sempre capazes de conservar certo grão de calor: os d'algudaão são preferiveis por serem mãos conductores de calorico e não embeber o suor.

5. ° Escolher alimentos de boa natureza, sustentar as forças, conservando uma diêta simples, e evitando todos os excessos d'este genero, fugir do uso de todos os alimentos seccoos, salgados, gordurosos, e adubados, como a carne do porco, as pastelerias, saladas, mariscos, e fructos mal sasonados, ou alterados, e de digestão difficil.

6. ° Pode-se faser uso da carne de vacca, carneiro, galinhas, ovos, e dos peixes frescos, e considerados innocentes: legumes de facil digestão, arroz bem cosido, bom pão, e farinha bem preparada.

7. ° Ter completa abstinencia das bebidas espirituosas, como aguardentes, genebra, etc., por isso, que a observação tem mostrado, que os individuos dados a estas bebidas, são os primeiros atacados, e que mais difficilmente se curão.

8. ° As pessoas habituadas, e as debeis podem faser uso do vinho com pareimonia, porem devem preferir o do Porto, e palhete sem acido, e cerveja superior, chá ou café com moderação, agua de boa qualidade, e limonada: tendo o cuidado de as uzar quando se não esteja suado.

9. ° Fugir de todo o excesso de qualquer genero que seja, assim como dos praseres venerios, danças, vigílias, insulações, e todas as impreções moraes: ter o espirito em perfeita tranquillidade, e afugentar o receio de ser accommettido.

10. Enfim, a moderação, serenidade d'espirito, confiança em Deos, e a pratica dos preceitos Hygienicos, são os mais seguros preservativos d'esta affecção. Finalmente apresentarei a quadra recitada por Mr. Moreau perante a Accademia de Medicina de Paris na Sessão de 18 de Março (a).

“ Tiens tes pattes en chaud,
“ Tiens vides tes boyeaux,
“ Ne vois pas Margaritte,
“ Du Cholera tu seras quitte.

SYMPTOMAS E MARCHA.

O Cholera Asiatico principia as veses bruscamente, porem as mais das veses por prodromos, como fraquesa, mollesa, sede, dores de ventre, borborrygnos, diarrheia amarellada ou branca, mucosa, e fetida, prostração, insomnia, frios vagos, e irregulares, suores, desfatlecimento, e lentidão do pulso. A estes symptomias é que se tem dado o nome de Cholerina, cujos symptomias persistem d'um á outro dias, e se terminão pela cura, ou morte em seguida á um progressivo emmagrecimento, como nós temos observado de Setembro de 1854 para cá, em mais de mil pessoas, constando-nos apenas

terem morrido tres, curados por mesinheiros particulares. Estes symptomas podem se ir aggravando successivamente até se caracterisar o Cholera, no qual se distingue 2 periodos distinctos, um dos quaes é geralmente caracterisado pela excitação do sistema vascular, e a extraordinaria perturbação dos órgãos digestivos: o outro pela prostração das funcções nervosas, e de circulação, e pela maior ou menor falencia das forças vitâes

Em certos casos esta affecção passa por estes periodos, offerecendo variedades segundo a combinação, e saliença dos symptomas d'excitação, ou prostração, em outros casos não se realisa o periodo da prostração, e somente o da excitação se manifesta em todo o curso da doença.

Dissemos que o primeiro ataque era precedido de certos signaes precursores, e de 2 periodos, o primeiro, ou d'excitação, é assignalado por vertigens e grande debilidade, o rosto pallido, e deprimido, sede viva, náuseas, calimbras d'estomago, intestinos, e extremidades, desassocego, calor, e dor no epigastro, e ventre, borborygmos, vomitos, e diarrhea amarella, branca, mucosa, e fetida, e oppressão no peito, ao que se segue uma maior reacção que exacerba os vomitos, e excita copiosas evacuações d'um liquido serô-esbranquiçado, assemelhado a agua d'arroz, o ventre então torna-se retrahido, pouco sonôro, e as dores mais vivas, que augmentao muitas veses pela pressão.

Estas evacuações despidas de materia belicosa, ou fecal são acompanhadas de cheiro fetido. A face revela a intensa agonia logo, que o espasmo das extremidades, e intestinos se aggrava, o pulso torna-se frequente e forte, e eleva-se rapidamente a 120 ou 130 pulsações por minuto, porem o calor da pelle algumas veses fibril, em geral nunca excede ao grão natural, a força diminue em proporção de sua frequencia, a respiração accelerada, penivel, e ansiosa. Os doentes accusão dyspnêa, a voz se enfraquece: ha vertigens, cephalalgia, zunidos d'ouvido, e calimbras dolorosas nos braços, dedos, e sobre tudo nos joelhos suas forças prostrão-se, e todo habito exterior exprime um extremo soffrimento, a face retrahida, e emmagrecida, os olhos encovados, e cercados d'uma orla ennegrada.

Symptomas estes, que se observão em geral em pessoas robustas, e que podem durar de 6 á 24 horas, os quaes se aggravando successivamente, se seguem do periodo da prostração, o qual é notavel pelo rapito, e extraordinario abatimento das forças, e funcções organicas vitâes: o cerebro se enfraquece parcialmente, conservando-se o entendimento claro, posto que debilitado: a superficie do corpo se torna em extremo fria, e as unhas das veses se cobre d'uma humidade viscosa, o pulso torna-se extremamente fraco, e por veses imperceptivel, e até mesmo as pancadas do coração, os olhos secos, embaciados, e sumidos nas cavidades orbitarias apparecem com um circulo negro, e as pupilas geralmente se dilatão. A face, mãos, pes e unhas tornão-se cõr de chumbo, azul ou amarelladas, o que muitas veses s'estende, posto, que em menor grão a toda a superficie da pelle, cujas funcções parecem completamente paralyzadas

Um dos phenomenos mais notavel é a rapida diminuição das partes molles do corpo, devida a rapida absorpção da substancia adiposa, e á acharem-se os vasos quasi, que abandonados pelos seus fluidos, e á um ponto tal, que no espaço de 24 horas pode qualquer cholerico ficar reduzido a um terço, ou menos do seu volume natural.

A pelle das mãos e pes enrugão-se, quasi sempre as calimbras perdem a sua violencia, limitando-se aos pes e mãos, que muitas veses ficão encolhi-

dos depois do fallecimento, a lingua branca, humida, e fria, a sêde vivissima, os vomitos em geral mais raros: assim como as dejeções involuntarias, e muitas veses formadas por um liquido arroxiado, e fétido, a voz extincta á ponto de quasi se não perceber, o halito frio, a respiração difficil, e o ar expirado contem as veses mais oxigenio do que no estado saõ, segundo as experiencias de Davy, e confirmadas por Rayer na epidemia de 1832.

Neste estado todo o padecimento se refere ao epigastro e coração, em cujas regiões os doentes sentem grande calor, oppressão, e intensa agonia: a insomnia torna-se grande, e a secreção urinaria torna-se rara, ou se supprime. Reduzida a tação tamentoso extremo os cholericos expiraõ, algumas veses repentinamente estando a fallar, sem a menor contusão, e conservando o cerebro em estado perfeito até a hora extrema, cessando o pulso de bater tão sómente algumas horas antes da morte.

Se o doente não morre no periodo algido, a doença muda de physionomia: assim o fim vai desaparecendo pouco á pouco. o pulso torna-se perceptivel, e reassume successiva, e lentamente a sua força e volume, a cyanose diminue, assim como o emmagrecimento, a face se cora, os olhos se injectaõ, a voz toma a sua força, e a secreção urinaria se restabelece, enfim o sangue paulatinamente readquire suas qualidades normaes: á reunião d'estes phenomenos, vê-se sobrevir a convalescença, s'algun accidente não a vem perturbar. Porem se a reacção é incompleta, é entaõ de novo substituida por novos symptomas algidos, que quasi sempre compromettem a vida do doente.

Em alguns casos a reacção se complica d'accidentis typhoides: assim em uns a febre se atêa, a lingua torna-se secca, aspera, e negra, os dentes fuliginosos, a sêde viva, e os soluços continuos, a face embaciada, e tocada d'estupor, coma, ou delirio, rigesa, contracções e sobre-saltos tendinosos: em fim depois de cinco, seis, oito, dez dias, ou mais, sobrevem a morte. Emfim, é ainda durante a reacção, ou em seguida, que sobrevem outras affecções, como as congestões, inflamações especialmente das meninges, cerebro, e pulmões: assim como a bexiga, escarlatina, e outras erupções, como affirmão alguns praticos.

Nem sempre o Cholera offerece a physionomia que apresentamos assim tem-se visto muitas veses accometter repentinamente, com os symptomas os mais graves do estado algido, terminando com a morte, e sem reacção, no espaço de seis a oito horas.

Esta é a forma mais maligna, e aterradora, designada geralmente pela denominação do Cholera fulminante: nestes casos ha muitas veses poucos vomitos, e diarreia, e as suas feições caracteristicas saõ extrema prostração, fortes, e frequentes cainbras.

DURAÇÃO.

O Cholera tem uma marcha rapida, e pode as veses matar em horas: a sua duração mediana é de 48 a 60 horas, algumas veses pode prolongar-se á um septenario, raras veses excede a 12 dias. Emfim a duração, e intensidade dos dous periodos da molestia varião conforme a idade, forças, e estado de saúde do individuo, no maior numero de casos, e mormente quando o Cholericos é velho, e tem a constituição debili, ou deteriorada por molestias anteriores, má alimentação, e bebidas alcoolicas, entaõ os symptomas d'exci-

tação são quasi sempre ligeiros e a maior parte das veses não apparecem: A convalescença é ordinariamente lenta, e exige muito cuidado para prevenir as recaídas, que frequentes veses tem lugar: alguns doentes conservaõ durante algum tempo a dyspepsia, e outras perturbações dos órgãos digestivos, permanentes, ou separadas por intervallos mais ou menos aproximados.

DIAGNOSTICO.

Attendendo-se a natureza dos vomitos, e dejecções, ao resfriamento da lingua, e todo o corpo, a imperceptibilidade, ou aniquilação do pulso, a côr de chumbo, azul, ou vermelha do rosto, mãos, pes, unhas, e muitas veses de toda pelle, a aphonía, supressão urinaria, e calimbras, é impossivel o confundir com outra affecção. 1) envenenamento pelas substancias causticas, especialmente pelo arsenico, é só o que pode simular o cholera asiatico, por causa do resfriamento do corpo, estado cynico da face, e extremidades, alteração da voz, dyspnêa, rareza, ou supressão das urinas, porem attendendo-se, que as dejecções são negras, e sanguinolentas, são mais que suficientes para tirar toda a duvida á respeito do seu diagnostico.

PROGNOSTICO.

O Cholera asiatico é uma molestia gravissima e mortal, tem exercido grandes estragos nos lugares em que se tem desenvolvido, e fere de morte a maior parte dos individuos por ella accommettidos: ella tem parecido mais temivel nos dous extremos da vida, e mais no homem, que na mulher: é mais grave na invasão da epidemia, que nas declinações: quando se manifesta o resfriamento, a côr cynica e o pulso suprimido, o perigo é grande.

TRATAMENTO,

Não ha certamente uma molestia contra a qual se tenha offerecido, e preconizado maior numero d'especificos do que o Cholera, porem é forçoso confessar, que até o presente não he conhecido: por tanto cada qual seguirá o methodo de tratamento, que as circumstancias de cada doente for mais ajustado, por isso iremos apresentando os principaes methodos publicados no Boletim do Cholera, pelo Ilustre Pratico, e escriptor Portuguez Candido Albino da Silva Pereira e Cunha (a)

Tratamento proposto por Blatim, e do qual assevera ter colhido grande vantagem em 1832

Primeiro, administrar ao doente agoa fria em alta dose, que algumas veses é preciso insistir por 24 horas até se desenvolver a reacção: e este author assevera, que esta medicação favorece o apparecimento do calor, e modifica as abundantes secreções albumino-serosas. No caso de persistir a diarrhea, é util juntar a cada litro d'agoa duas onças de claras d'óvos,—e que a addicção de 15 a 20 gram d'acetato d'ammoniac, parecia favorecer eminentemente o movimento circulatorio, e desenvolvimento do calor, expecialmente

(a) Jor. das Sci, Med. de Lisboa Tm. 4.

nos velhos, e pessoas fracas, e que n'aquelles, que tinham repugnancia pela agua, a ipecacuanha n'alguns dispertou a sede e produziu os melhores effeitos. A principio a agua sabe expellida pelo vomito, turva e com mais ou menos porções d'albúmina, porem depois vae cada vez sabendo mais pura, e os vomitos vão se tornando mais raros a medida que a reacção se vae estabelecendo: então o doente pode diminuir a dose d'agua e tomar alguma porção de caldo ou leite.

O segundo meio por elle gabado, são as inspirações forçadas: assim exigia, que os doentes fizessem profundos e grandes esforços inspiratorios, permitindo-lhes apenas alguns intervallos de repouso.

Era nenhum outro agente reconheceo tanta efficacia para provocar o calor: assim em 181 Cholericos curados, mais d'um terço foi submettido a agua fria em alta dose, e á inspirações forçadas.

Tratamento proposto pelo Dr. Beaurepaire.

Consiste em ministrar 120 gram d'agua distillada de flor de laranjeira, em 24 horas, a partir do momento da invação da molestia.

Tratamento indicado pelo Dr. Woams.

Recommenda administrar immediatamente 2 gram. d'ipecacuanha, e para bebida infusão de Tilia e hortelan pimenta, e applicar sobre o estomago um emplastro do seguinte.

R.

Theriaga.....	15 gram.
Balsamo do Peru.....	15 gram.
Olio essenciai d'hortelan pimenta....	15 gram.

E sobre este emplastro um tijolo quente: tendo previamente o cuidado de cobrir a superficie do emplastro com canfora em pó.

De duas em duas, ou de tres em tres horas, esfregar os membros com uma esponja molhada no seguinte:

Camphora.....	2 gram.
Alcool rectificado.....	120 gram.
Vinagre.....	300 gram.

Tinctura de capsicum annuum.

Internamente uma colher d'hora em hora da poção seguinte:

R.

Ether sulphurico.....	15 gram.
Ammoniaci liq.....	3 gram.
Tinctura de capsicum.....	1 gram.
Camphora.....	2 decigram.

E quando existir dor no estomago ajunte 15 gram de theriaga.

Logo que a reacção começa, e o frio diminue, deve-se substituir as poções estimulantes, e ministrar em seu lugar uma bebida diaphoretica com o carbonato d'amoniaco, ou nitrato de potassa, se ha reacção, ou ameaça ser excessiva. Assim como juntar a qualquer medicação interna, a camphora na dose de 3 a 6 grãos.

Procedendo este author autopsia n'um doente, que tinha morrido n'um

grande estado de depressão, observou, quando abriu o craneo, sahirem duas o tres colheres de serosidade: pensou que talvez esse derramamento fosse devido ao restabelecimento subito da circulação, causante o effluxo de grande quantidade de sangue arterial ao cerebro, ainda quando o systema venoso se achava destendido pela secosidade. Imaginada esta indução cousecou, que a melhor therapeutica seria activar a absorção. Levantada, assim ao primeiro doente que lhe appareceu com o estado comatoso, mandou raspar a cabeça, e applicar uma flanelle molhada na seguinte mistura,

Alcool camphorado.....	150 gram.
Ammoniac liq.....	25 gram.
Infusão d'arica.....	100 gram.

Dissolva.

Chloridato d'ammonico.....	45 gram.
----------------------------	----------

O resultado foi o melhor: assim continuou applical-o no periodo cyanico, e os bons effeitos nunca se desmentirão.

Poderoso revulsivo aconselhado pelo Dr. Pelikan, Medico em S. Petersburgo, no periodo algido d'esta affecção.

Consiste em embrulhar duas libras de cal viva em um lenço molhado, que deve ser collocado dentro da cama e junto ao doente. O grande calor, que se desenvolve immediatamente, é um poderoso meio para provocar o suor e a reacção.

Gravim Myvroy propõe para o tratamento da cholera a dissolução aquosa de sal commun como efficaz remedio no primeiro periodo.

Este A. manda dar uma colher de sal em uma chavena d'agua, que se deve repetir até produzir vomitos energicos, e no caso de continuar a diarrhea, clysteris d'agua salgada.

Tratamento usado por Lefreve Rousseau.

Este A. propõe, que se feche o doente em um quarto, sem communicação com o exterior, e que se queime pimenta em grande quantidade, para que continuamente respire este cheiro: e mais, sendo possivel, meter o doente n'um banho quente, que contenha uma boa porção de pimenta, e ali deixal-o até apparecer o suor, e dar de beber alguns copos d'agua, com alguns grãos de pimenta.

Tratamento que assegura o Dr. Depierreis ser d'excellente utilidade.

Este A. ordena que se ministre 125 gram. da seguinte poção, e se continue d'hora a hora a ministrar 10, 15, 20, ou 30 gram. até que a diarrhea cesse:

R.	
Agua ferment.....	150 gram.
Cato em pó.....	10 gram.
Valeriana em pó.....	3 gram.
Infund. cõe e ajunte:	
Laud liq. do Syd.....	6 gottas.
Ether sulphurico.....	4 got.

Eliot indica a seguinte formula durante o periodo algido, para provocar a reacção, como vantajosa,

Infusão quente d'hortelã pimenta. 150 gram.

Acetato d'ammoníaco liq. 50 "

Laud. de Syd. 3 "

Charpe commun. 60 "

Par: ministra immediatamente a primeira vez meio copo, e d'ahi em diante duas colheres de dez em dez minutos.

Tratamento proposto por Piorry.

Este A. aconselha inecções d'agua e diz, que no espaço d'uma hora introduzida na bexiga d'un doente, quasi duas litras d'agua na proporção de 60 gram. por cada vez: o doente melhora, o pulso desenvolve-se, e os symptommas mais graves modificam-se rapidamente.

Tratamento indicado por Chomel.

Este A. admite 4 formas de Cholera: 1. ^a Nervosa, caracterizada por predominancia de dores, cainbras, e oppressão nas viceras

2. ^a Algida, assignalada por perturbações de circulação, respiração, e diminuição de calor.

3. ^a Gastro-intestinal, saliente pela abundancia d'evacuações.

4. ^a Inflamatoria, que tem muita semelhança com a gastrite aguda, e dysenteria.

Contra a primeira forma emprega o opio pela bocca ou em clyster, e ao mesmo tempo por ambas as vias, quando é possível, no caso d'impossibilidade, pelo methodo endermico.

No periodo algido, emboracções secas á vapor, sacos d'arêa, e botijas quentes na periphèria do corpo: repara as emboracções humidas por favorecer a adhesão do suor viscoso á pelle, que com a diarrèa e vomitos ajudão a colliquação: aconselha fricções secas de fumos aromaticos de beijoim, e incenso; e nos robustos e atacados á pouco, fricções com neve pilada, e internamente chá, café, ponche, e bebidas alcoolicas. Se o doente sente calor, em vez d'estas, as refrigerantes.

Na inflamatoria, sangrias geraes ou locaes, banhos, cataplasmas sobre o ventre, e bebidas emollientes com o opio. Se os vomitos são tenases, ventosas escarificadas sobre o estomago, poção antiemetica de Riviere, e o subnitrito de bismutho, etc

A diarrheia, pela diminuição das bebidas, clysteres adstringentes, e em ultimo caso, á um largo visicatorio no abdomen.

Contra as cainbras, fricções com linimento opiacio e opio, internamente. Se ha dyspnea e febre, emissões sanguinias geraes, se não coincide com a febre.

Hasendo accidentes cerebraes recorre aos revulsivos, e exclue o opio. A fraquesa com os tonicos.

Tratamento de Rostan.

No periodo algido, manda recorrer aos banhos á vapor, ou aos banhos quentes de 40 a 42 cent.: ao sahir do banho uma infusão quente de camomilla, e sobre os membros, fricções com linimento ammoniacal.

Se não apparece a reacção ministra uma poção etheria com alcool , ou laudano. Este A. pensa que um dos elementos principaes d'esta doença é a acidez das secreções, pelo que desde o principio ministra poções alcalinas, ou com 20 got. d'ameiônico, ou com 8 gram. d'agua de cal., com 120 de vehiculo; os vomitos e evacuações, com extracto d'opio e clysteres amylaceos com 6 got. de laudano em cada um, e se o vomito persiste, um vesicatorio sobre a região epigastica: e quando ha signaes de congestão, emissões sanguinias, com parcimonia.

Tratamento de Cruveillier.

Ministra poções quentes com ether no primeiro periodo, e depois a seguinte, associada aos excitantes, adstringentes e narcoticos.

R.

Agua distillada d'hortelan pimenta... 120 gram.

Extracto de catu..... 1 “

Laud. de Syd..... 20 got.

Para combater a diarrhea clysteres com 15 a 20 got. de laudano; as dores que apparecem no thorax e abdomen combate até que cessem com emissões sanguinias locaes: no periodo algido fricções insitantes, e sinapismos nos membros: nos casos graves, ou fulminantes, faz tomar uma colher da seguinte mistura de meia em meia hora,

R.

Laudano 3 gram.

Ammoniaco 5 “

Ether..... 15 “

Nos intervallos agua morna adoçada com charope gommoso, sinapismos sobre o abdomen, e um visicatorio no thorax ou columna vertebral.

Tratamento por Martin Selon.

Este A. emprega duas ordens de meios, uns destinados a combater os diversos symptomas, e outros destinados á obrar de um modo especial sobre a economia, e á modificarem o estado do sangue. A primeira ordem comprehendendo os banhos d'ar seccos e quentes, e a seguinte poção no periodo algido,

R.

Laud. de Syd..... 20 gottas,

Licor d'Hoffmann..... 12 “

Infusão d'hortelan pimenta..... 60 gram.

Ammoniaco 20 got.

Charope commun..... 30 gram.

Alternando esta bebida com ponche; clysteres amylaceos laudanizados para a diarrhea, e para promover a reacção, sinapismo no thorax, e columna vertebral. Na segunda ordem de meios administra o sub-carbonato d'ammoniaco, e um julepa, que contem 10 gram d'ammoniaco, e 15 gottas de laudano: os vomitos combate com ventosas escarificadas no epigastro, ou com um visicatorio, que cura depois com um centigr. de chloridrato de morphina: contra a diarrhea emprega os clysteres de subnittrato de bismutho: para estabelecer a secreção urinaria, um decocto de gommia nitrato, e durante a convalescença, vinho generoso com agua de Seltz.

Tratamento de Serres.

Considera o Cholera como uma affecção typhoide perniciosa, e devida o tratamento em duas ordens de meios: os primeiros, destinados a combater os accidentes do primeiro periodo, e os segundos, as alterações do segundo aquelles compõe-se da poção antiemetica de Riviere: agua de Seltz, limonada citrica, e em 24 horas dous ou tres clysteres preparados com camphora, sulphato de quinnio, laudano e agua de gomma.

A medicação especifica é constituida por fricções mercuriaes sobre o ventre, muitas vezes, na dose de 8 a 10 gram. no dia conforme os casos, e internamente sulphureto negro de mercurio, e o ethiops mineral.

No periodo algida, bebidas excitantes, e botijas quentes: no caso de cambras fortes, uma poção com ethiops, e os phenomenos comatosos com sinapismos, bixas atraz das orelhas, e laxantes.

Tratamento de Gendrin.

Este A diz, que o Cholera consiste em cinco ordens de phenomenos, que successivamente se desenvolvem.

1.º Phenomenos prodromicos: 2.º os phlegmorrhagicos; 3.º espessamento do sangue, devido as perdas da parte liquida: 4.º suppressões das secreções: 5.º reacção. As principaes indicações são as seguintes: 1.º faser parar a hypersecreção gastro-intestinal: 2.º modificar o sangue de forma a restituir-lhe a sua composição normal: 3.º moderar os accidentes febris da reacção: 4.º evitar ou combater as congestões.

Contra a forma sabural, ou diarrheica dos prodromos, emprega os emetico-catharticos, e a ipecacuanha com agua de Seltz, ou sulphato de sôda. Se ha vertigens, ou cephalalgia, sangria, diéta tenue, e uma pequena porção d'opio, repouso na cama, e temperatura um pouco elevada para excitar a transpiração. Se a molestia progride, prescreve opio em alta dose, se continua a diarrheia, e sobrevem cyanose, fricções de qualquer linimento estimulante: no periodo algido, continua ainda á dar o opio, mas principalmente infusões estimulantes de camomilla, tilia, etc.; sinapismos, visicatorios e fricções estimulantes, muitas vezes a sangria, mas como o sangue não corre, deixa a veia aberta, e manda praticar as fricções ditas no membro: na reacção usa da medicação symptomatica.

Tratamento de Bouvier.

Emprega contra a diarrheia, agua d'arróz e clysteres gommosos laudanisados: contra os vomitos, agua de Seltz a neve, poção anti-emetica de Riviere, sinapismo no epigastro, bebidas em pequena quantidade, laranja para humedecer a bocca.

Com o fim de sustentar as forças e deslocar o movimento inflammatorio dos intestinos para o pello, emprega as bebidas excitantes e tonicas, as infusões de chá, cafe, vinho, ponche, sinapismos, e fricções com linimento volatil antirridado: emprega os alcoolicos com reserva, por temer as congestões cerebraes e secutivas: para as combater (quando existem), usa de sinapismos, visicatorio na nuca e coxas, e raras vezes das emissões sanguinias: se ha delirio recorre ao opio, e antispasmodicos.

Tratamento de Durand.

Apenas chegado ao doente, manda vestir uma camisa de meia de lã, um banho d'ar quente secco, e duas gram d'ipecacuanha em duas doses, e vai dando infusão d'ipecacuanha para favorecer os vomitos e diaphoresse, bem quente, e repetidos por seis veses, repete a infusão se o doente soffre náuseas, ou accusa plenitude no estomago. Se por este meio se não restabelece franca reacção, dá o elixir seguinte:

R.

Genebra da Hollanda..... 1 litro.

Macere por 3 dias.

Raiz de Gencianna.....

„ d'Angelica.....

„ d'Inula helinia.....

„ de Calomelanos aromatico.....

} aa 45 gram.

Sustenta depois a excitação com uma ou duas colheres das poções seguintes.

R.

Agua distillada d'ortelan pimenta..... 100 gram.

Ether sulphurico..... } a a 4 gram.

Acetato d'Ammoniac..... }

Quando ha calimbras junta á esta poção laud. de Syd., que ministra ás colheres de quarto em quarto d'hora, alternando com uma chavena de chá al coolisado.

Para bebida ordinaria, infusão de flor de laranjeira, com acetato de ammoniac, no fim de 2 horas repete-se o elixir, e a poção, se não se desenvolver bem a reacção, quando se estabelece, continua-se a dar o chá: se é intensa, agua de Sedlitz, ou 2, 3 e 4 poções da formula seguinte.

R.

Maná..... 60 gram.

Sulphato de magnesia..... 20 „

Em seguida, cosimento de sevada com mel, ou 3 chavenas de chá, com 45 gram de sulphato de magnesia: pode-se substituir a agua de Sedlitz pela limonada de citrato de magnesia, e dar em 24 horas 2 ou 3 clysteres purgantes com sene, e sulphato de sôda.

Se apparecem phenomenos comatosos, insiste nos laxantes, e clysteres purgantes, e ao mesmo tempo fomentações na cabeça com a seguinte agua sedativa.

R.

Agua..... 30 gram.

Alcohol camphorado..... 15 „

Sal marinho..... 50 „

Se continuão estes phenomenos, bixas atraz das orelhas, e cosimento de sevada e mel, com 10 grãos de sal

Se persistem os vomitos, agua de Sedlitz, ou uma poção as colheres, com 8 decigr. d'alumen calcinado. Se ha diarrea persistente, clysteres com acetato de chumbo. No caso de persistencia de phenomenos comatosos, e se manifestã-c-se por paroxismos, prescreve uma gram. de sulphato de quinino em poção, ou 2 ou 3 gram. do mesmo sal em clyster.

Tratamento de Barth.

Emprega 3 ordens de meios, e simultaneamente conforme a predominancia dos symptomas.

1. ° Contra os vomitos, a poção de nitrato de prata na dose de 5 cent., e contra a diarrhea, na de 15 ou 20, e diz, que raras vezes lhe foi necessario empregar por mais de dous dias.

2. ° No periodo algido ministra o extracto alcoolico d'haschich, suspenso n'uma gema d'ovo, e na dose de 5 cent. ou então.

R.

Chlorureto de sodio..... 15 gram.

Xarope de diacodio..... }
Agua d'hortelan pimenta..... } a 30 gram.

Tambem ministra o sal commum em clyster na dose de 15 gram.

Para provocar a transpiração o seguinte:

R.

Agua distillada d'hortelan pimenta..... 30 gram.

Alcoholato d'herva cidreira..... 30 „

Sub-acetato d'Ammoniaco..... 10 até 15 gram.

Xarope de casca de laranja..... 15 gram.

Ether..... 6 got.

3. ° Depois de bem desenvolvida a reacção recorre ás emissões sangui-nias, e revulsivos cutaneos, segundo a intensidade dos phenomenos, que apparecem.

Tratamento de Falret.

A' principio cosimento d'arroz, e clysteres de gomma laudanizados, se persiste a diarrhea, ou de ratania, que sendo insufficientes, aos de nitrato de prata na dose de 15 centigr.: contra os vomitos, a poção antiemittica de Rivere.

Se apesar destes meios se desenvolve o estado algido, recorre a ipecacuanha, e ao calorico na periphéria do corpo. Nestas circumstancias usa as vezes dos calomelanos na dose 30 a 40 centigr., e cataplasma emolliente no abdomen, e diz ter tirado vantagem da applicação d'um esquentador cheio d'agua quente, sobre o ventre, que diminue, ou suspende as dores, e aperto da região epigastrica: sinapismos em toda periphéria do corpo, banhos sinapizados, fricções seccas, ou com linimentos alcoolicos, poções de sub-acetato d'ammoniaco na dose de 15 a 20 gram., e laudano na dose de 20 a 25 gott.

Contra as caimbras. pranchetas embebidas em chloroformio, nos pontos dolorosos: o sesqui-chlorureto de carbono, (uma só vez) para desenvolver a reacção.

Tratamento de Selut.

Emprega principalmente duas ordens de meios, excitantes, e adstringentes.

Os primeiros são destinados a provocar a reacção, e os segundos a combater as evacuações alvinas.

No periodo algido ministra um banho a 30 ou 40 grs. de Reaumur, e logo depois uma infusão aromatica bem quente, e com acetato d'ammoniaco.

Quando começa a reacção, faz muito uso do café, e do vinho de champagne.

Contra a diarrhea, emprega os clysteres com o nitrato de prata, que reputa ser o meio menos fallivel.

Na reacção usa com mão larga das sangrias, principalmente se ha phenomenos comatosos, e de congestão

No periodo da invasão da molestia, e principalmente havendo nauseas, e anciedade epigastica, usa ministrar um emetico assim formulado:

R.

Ipecacuanha..... 1 gram.

Tartaro emetico..... 5 centigr.

Tratamento de Levy.

Este Medico Militar muito se distinguio no tratamento da epidemia de Paris. Levy reconhece 3 periodos nesta molestia: o prodromico, e o de reacção sobre os quaes a Medicina possui meios regulares, e efficazes: o cianico ou algido de cholera confirmada, que ainda pertence ao dominio das tentativas, e das experiencias.

1.º Prodromicos. Comprehende o primeiro espaço, que vae desde a perturbação da saude, até ao apparecimento das dejeções brancas. Neste periodo distingue 3 formas:

1.º Nervosa: (cephalalgia, vertigens, lumbago, espasmos, etc.) Repouso na cama, chá, e bebidas sudorificas: se não cede recorre a ipecacuanha em dose emetica.

2.º Saburral: (bocca saburrosa, anorexia, dores lombares, etc.)—Medicação vomitiva—acompanhada de purgante, se ha intumescencia no ventre.

3.º Diarrhea, ou Cholera: (alguns, ou todos os phenomenos precedentes acompanhados de soltura de ventre.) Opiaceos, principalmente em clyster, no caso de persistencia, emprega a ipecacuanha.

2.º Cholera caracterizada. Admitte neste periodo tres formas.

1.º Forma cianica, com o pulso filiforme, ou forma adynamica: (cyanose, pelle inerte, suor frio, prostração profunda, olhos encovados, etc.) Banhos d'ár quente, poções estimulantes com acetato d'ammoniac (10 a 30 gram.), café quente, chá d'herva cidreira com tinctura de canella.

2.º Forma algida com predominancia de symptomas digestivos (vomitos, e dejeções alvinas abundantes). Todos os meios servem para applicar o calorico á periphéria: café quente: sinapismo na região epigastica, e em ultimo caso um visicatorio ammoniacal n'aquella região, curado depois com o acetato de morphina: persistindo o vomito emprega o sub-nitrato de bismutho na dose de uma gram d'hora em hora, (até 10 ou 12 gram)

Levy faz um prognostico mais favoravel nos casos em que ha evacuações alvinas abundantes, do que n'aquelles em que faltão, ou são pequenas, ou cessão de repente.

3.º Forma algida com predominancia de symptomas nervosos, ou espasmodicos: (cyanose em ultimo grão, pulso nullo ou imperceptivel, calimbras violentas, contricção no thorax, enovamento dos olhos, anciedade profunda.) A applicação de banhos d'ár quente á estes doentes, é insupportavel, externamente emprega as fricções com a essencia de therebentina, o

alôo d'amendoas doces camphorado, e laudanizado, o balsamo tranquillo, chloroformio: internamente o ether e o laudano

Os doentes que offerecem esta forma são quasi sempre victimas da moléstia: esta e a forma adynamica inicial são segundo Levy, as mais funestas variedades da epidemia.


3.º Reacção. Aqui torna a ser efficaz a Medicina. Este periodo é caracterisado pelas congestões nos diversos órgãos. Podem reduzir-se á tres especies mais frequentes.

1.ª Congestões encephalicas: trata-as segundo as occurrencias pelos purgantes, bixas na região mastoidea, posição senta la, revulsivos nos extremos, e vesicatorio na nuca.

2.ª Congestões pulmonares: trata-as pelo emprego combinado de pequenas sangrias (250 gram.), emetico opiado (emetico 3 decigr., opio 5 centigr.), e vesicatorio

3.ª Congestões abdominaes: emprega as ventosas escarificadas no abdome, cataplasmas laudanizadas, etc

Tão são os differentes methodos de tratamento, mais recentemente preconizados pelos jornaes estrangeiros e que extrahimos dos Jornaes das Sciencias Medicas de Lisbon, dos quaes cada um pode tirar o partido conveniente com a razão, e a Sciencia, cujo valor não disntiremos, porem diremos, que posto que o Cholera se não subjeite ao methodo uniforme de tratamento, por varie as circumstancias, todavia em muitos cazos poderão ser usados qualquer dos methodos indicados, entre os quaes existem muitos, que honrão á seus authors, e dos quaes as capacidades predilectas da Sciencia melhor pode avaliar, do que a nossa apoucada capacidade Medica.



VERMES INTESTINAES

Os vermes intestinaes habitão o canal intestinal do homem, sobre tudo os intestinos delgados: contão-se quatro especies, que vem a ser Ascaris lombricoides, Ascaris vermicular, Ténia, ou solitaria de que ha duas especies, que vem á ser a Ténia lata, e a Ténia solium, e o Tricocephalus. As duas primeiras variedades são de que nos occuparemos, por serem importantes, e as que com mais frequencia se dão nos habitantes d'esta localidade.

A Ascaris propriamente dita apresenta uma cor amarelada, ou rosá mais ou menos escura, seu corpo cilindrico, e elastico apresentando de 3 á 12 polegadas de comprimento, e de 2 a 3 linhas de largo, adelgazando para os extremos, mais para o lado da cabeça, onde existe a boca, formada por tres valvulas moles.

A Ascaris vermicular tem o corpo filiforme, branco, e de comprimento de 2 a 5 linhas. cabeça obtusa, e vesiculosa assada d'uma pequena abertura, os machos são mais pequenos, que as fêmeas, occupam esca mente o réto junto ao anus onde se desenvolvem prodigiosamente em numero, e produzem uma comichão impertinente e desagradavel. Linco e seus sectarios suppunhaõ, que os vermes d'estes vermes provinhaõ do exterior, e estão habitos d'agua, ou incorridos com os alimentos, e davão como prova, a similitude que ha entre os entosarios, e os vermes da terra: podem ter-se objectado, com razão, á esta hypothese, que os entosarios podião existir no

corpo do feto, e no seio dos órgãos, que nem uma comunicação apresentam com o exterior: outros como Pallas, e Brera pensão que os germens, produzidos pelos entosarios, são expulsados pela economia, para onde depois entram por intermedio do ar, dos alimentos, e bebidas, porem esta doutrina afasta a difficuldade sem a vencer, admitindo a existencia espontanea d'um helmintho, hypotheses estas refutadas por Bremser, Swammerdam, Rudolphi e outros, os quaes fazem depender a existencia d'estes seres, d'uma geração espontanea, e quizerão tambem explicar, deduzindo-a d'hypotheses sobre a criação do Universo, da qual, segundo suas phantasias, todos os entes tinham a mesma origem, que os vermes infusorios: finalmente outras supposições, não menos absurdas, tem apparecido, sem que tenha servido, se não para augmentar a incertesa, e inverosimilhança de cada uma d'ellas, ficando assim ainda problematica a criação dos vermes intestinaes. Estas affecções, segundo a sua importancia, offerecem contradicções: assim Abilgard considera a produção dos entosarios, devida a inercia do tudo digestivo, e suppõe a sua existencia proveitosa como uma estimulação salutar do mesmo canal. Goëze levado pela ideia de que todos os seres serão criados para proveito, ou recreio do homem, considera a existencia dos vermes proveitosa a saude, porque, segundo elle, são consumidores do excesso de mucosidade intestinaes. Ganthier professando a mesma crença, faz depender a regularidade das principaes funções, do organismo do estimulo provocado pelo atrito dos vermes.

Alguns como Fortassim, Marteau de Grand Villiers, e outros, fazem depender todas, ou a maior parte das intermidades, da existencia dos vermes intestinaes. Outros enfim como Serres, e Courbon efforçam-se por provar a influencia damnosa da presença dos vermes, á ponto de os considerarem como causa directa da morte, por encontrarem em varios cadaveres os intestinos perfurados pelos vermes.

Grande excesso se nota nestes oppostos juizos, porem os pathologistas modernos, mais solidos em principios, collocão com razão as doenças verminosas no centro d'esses extremos, por isso, que sendo a existencia dos vermes intestinaes precedida, e acompanhada d'um estado morbido mais ou menos intenso das vias digestivas, e seguidos de varios outros phenomenos, temos, que avaliada a importancia d'esses estados, antes e depois da existencia d'esses seres, é mais que razoavel o procedimento dos modernos.

CAUSA.

Encontra-se em todas as idades, sobre tudo na infancia pelo abuso das substancias saccharinas, frutos mal sasonados, e de pessima alimentação. por isso, que o estomago exposto de continuo ao trabalho digestivo d'essas alimentos, pouco á pouco perde a sua força, a ponto de fornecer um chyme alterado, do qual o chylo fornece apenas uma nutrição imperfeita, o que dá lugar a fraqueza dos órgãos, manifestada pela palidez, emaciação etc.

O sexo mais sujeito a ellas é sem duvida o feminino: neste o temperamento lymphatico, e a vida sedentaria demonstrão, que a energia gastrica nestas é fraca, e preenche-se com lentidão, e fraqueza, o temperamento lymphatico pela fraqueza dos órgãos gastricos, explicada pela escacez da força vital de todo organismo; e temperamento nervoso, porque as potencias vitaes

não se achão equilibradas, o que faz que a vida organica parece ceder uma parte de seu poder á vida de relação.

Os habitantes dos climas pantanosos são incontestavelmente sujeitos aos vermes, por isso que produzindo a debilidade geral, sobre tudo dos órgãos gastricos, explicão a razão de sua frequencia nestes lugares, indicada por diferentes observadores: pelo que parece, que a hypostenia gastrica, é uma condição necessaria á creação dos vermes; ou seja porque as mucosidades, provenientes da atonia digestiva, alterando-se se convertão em vermes. (admittindo-se a geração espontanea) ou por serem essas mucosidades apropriadas á sua creação e propagação, admittir-se, que venhão do exterior os vermes: finalmente seja qual for á sua origem, o que parece razoavel, é, que a atonia gastrica n'isto figura na sua producção, a qual presidindo ao seu desenvolvimento, persiste até que com o tempo elles cresçam em numero, e volume, que revolvendo ou velando em diferentes pontos a tunica mucosa intestinal, dê lugar á symptomas d'irritação gastro-intestinal, em relação á excitabilidade individual, assim como a accidentes outros, tães como por sua accumulção uma massa consideravel d'estes vermes em uma porção d'intestino herniado, possa produzir symptomas de estrangulamento.

Factos estes, que posto que não demonstrados, concebe-se a sua possibilidade: alguns autores citão perfurações intestinaes, o que foi refutado por Bremsér, Rudolphi e outros, porem concebe-se hoje, que quando este órgão é amolecido, ou profundamente ulcerado, uma forte pressão exercida pela cabeça de vermes o pode atravessar: os vermes sahindo dos intestinos podem cahir no peritonéo, e só poder sahir provocando a formação d'abcessos, de que ha numerosas observações na sciencia, e tem-se visto penetrar os canaes biliares, e remontando o exsulfago se ir alojar nas anfractuosidades das fôssas nasaes, enfim penetrando na laringe, trachéa, e bronchios, determinar accidentes de suffocação, muitas veses mortaes etc., porem a observação diaria demonstra, que estes accidentes só tem lugar em cazos raros.

SYMPTOMAS.

São dores agudas ou obtusas umas veses fixas, outras movéis, ao estomago, e diferentes pontos do ventre o qual apresenta grande volume e desigualdade, borborrymos, eructações, e pyrosis, palidez do rosto, emmagrecimento, palpebras asuladas, pupilas dilatadas, grande affluxo salivar, sobre tudo de manhã, náuseas, vomitos, tuncismos, prurido no anus, e fôssas nasaes, tosse secca, lingua carregada, alito fétido voracidade ou anorexia, rangimentos de dentes, trismo, ou espasmos clonicos, febre, as veses continua, as mais das vezes por accesso, como temos observado.

TRATAMENTO.

Logo que as crianças são accometidas de lombrigas, é preciso prevenir a sua reproducção por uma hygiene conveniente, assim deverão habitar lugares secos e quentes, se lhe administrará uma nutrição substancial, usarão de roupas de lã, e farão uso de bebidas tonicas, e para destruir as lombrigas administra-se os anthelminticos, cujo numero é consideravel: assim tem-se preconisado contra os vermes o musgo da Corsega, alhos, losna, açafraão, feto macho, camfora, hortelan pimenta, valeriana, execencia de tereben

lina, ether sulphurico, olio de recinus, jalapa, calomelanos, rhuibarbo, etc. Substancias estas que se podem dar sós ou combinadas em pós, pilulas, pastilhas, bebidas, e clysteres; este ultimo meio sempre é de grande utilidade nas ascaridas vermiculosas, porem de todos os meios indicados, sempre temos colhido vantagem em nossa pratica, da preparação vermifuga Americana de Fanestok, com o sumo recente de folhas de mastruço de 2 a 4 colheres. misturado com igual dose de olio de recinus, para ser tomado por uma só vez; o que repetimos no segundo dia, quando os seus effeitos são pouco pronunciados: sobre todos a santonina na dose de 2 a 4 grãos, em pastilhas, segundo a idade.

PESTE.

Synommia. Doença contagiosa, pestilencial, febre do Levante, typho do Oriente, ademo-nervosa etc.

Esta doença é mencionada pelos livros sagrados, authores gregos e Latinos que descreverão um grande numero d'epidemias mortíferas,

Só do sexto seculo para cá é que tem apparecido um grande numero de discripções mais precisas; depois desta epoca, ate hoje tem havido um numero infinito d'epidemias em todas as provincias do antigo continente, e d'estas as peiores forão as do seculo 15, 16, e 17 e d'então para cá tem sido o objecto dos mais importantes trabalhos.

E' uma affecção aguda, e epidemica, que independente dos phenomenos, que são communs as outras molestias pestilenciales, é caracterisada por bubões, anthrax, carbunculos, e petechias gangrenosas.

Mr. Desgnettes admite tres graus; primeiro, caracterisado por febre ligeira, sem delirio, e por bubões, que se curão promptamente. Segundo, assignalada por delirio, bubões nas virilhas, axilas, no angulo da maxilla, que se podem modificar ao quinto dia, e se terminar com a febre ao septimo.

Terceiro, febre acompanhada de symptomas ataxicos mais ou menos intensos. delirios consideraveis, bubões, carbunculos e petechias, anthrases, tem a sua sede nas partes carnudas não cubertas de pelle como a face, pescoço peito, costas e membros, que se modificão, ou terminão pela morte do terceiro ao sexto dia, symptomas estes, que parecem ser dependentes, ou produzidos por um envenenamento measmatico, cuja discripção aqui limitamos, e cujo tratamento suprimimos, por que até o presente não temos sido, e nem esperamos ser incommodados por ella, apesar das circumstancias, que parecem ainda poder concorrer para o seu apparecimento.

FIN.

N'esta obra alguns erros escaparão ao revisor das provas.

Poderíamos appresentar aqui, a imitação de muitas obras, uma errata, porem preferimos pedir aos nossos leitores que os corrijao a proporção que forem lendo, e que nos desculpem estas faltas, que s'encontrão em todas as obras, e em todos os authores.

Aos nossos assignantes agradecemos de todo o coração a generosa cooperação que nos prestarão.

